

Cisto de retenção mucoso em glândula salivar menor: relato de caso

Romeiro, L. R.¹; Lopes, H. F. C.¹; Honorato, M. E. A. F.¹; Oliveira, D. T.²; Figueiredo, C. E.¹; Freitas-Filho, S. A. J.¹

¹ Faculdade de Odontologia, Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino (UNIFAE), São João da Boa Vista/SP.

² Departamento de Cirurgia, Estomatologia, Patologia e Radiologia (Área de Patologia), Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo.

Paciente do sexo feminino, feoderma, 55 anos, compareceu a clínica de Diagnóstico Bucal com a queixa principal de “lesão em boca”. Ao exame físico intraoral apresentou lesão nodular, bem delimitada, base séssil, recoberta por mucosa oral sem sinais inflamatórios, firme à palpação, medindo aproximadamente 3 mm x 3 mm, em mucosa jugal próxima ao fundo de vestíbulo inferior esquerdo e assintomática. Diante dos aspectos clínicos, o diagnóstico presuntivo foi de mucocele. Foi realizada a biópsia excisional da lesão e o material foi encaminhado para análise histopatológica. O diagnóstico final foi de cisto de retenção mucoso. O cisto de retenção mucoso ou cisto de retenção salivar é um cisto de desenvolvimento verdadeiro que resulta do acúmulo de saliva no interior do ducto excretor de uma glândula causado principalmente por obstrução. Como na presente situação clínica, é frequente em adultos podendo surgir onde haja glândula salivar menor, como em mucosa jugal, lábios e assoalho de boca. O presente trabalho ilustra um caso de cisto de retenção mucoso em glândula salivar menor tratado com excisão cirúrgica conservadora, conforme preconizado pela literatura, sendo a análise histopatológica essencial para o estabelecimento do diagnóstico definitivo.

Categoria: CASO CLÍNICO