

## Hipomineralização molar incisivo severa em dentes anteriores – alerta ao *bullying*

Fernanda Nogueira Rech (0009-0002-0142-676X)<sup>2</sup>, Marta Santos Oliveira De Valente<sup>2</sup>, Isabella Claro Grizzo, Bianca Longo Polo, Sergio Kiyoshi Ishikiriama<sup>2</sup> (0000-0003- 0064-1783), Daniela Rios<sup>1</sup> (0000-0002-9162-3654)

<sup>1</sup> Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, Bauru, São Paulo, Brasil

<sup>2</sup> Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, Bauru, São Paulo, Brasil

A hipominealização molar incisivo (HMI) é um defeito qualitativo do esmalte que obrigatoriamente afeta molares permanentes podendo ou não acometer também os incisivos. Clinicamente a HMI se apresenta como uma opacidade demarcada com coloração branco-creme à amarelo-marrom. Devido ao maior conteúdo orgânico e menor conteúdo mineral, o esmalte é frágil e susceptível à fratura pós eruptiva. Na área de incisivos, devido ao baixo impacto mecânico, as opacidades dificilmente se fraturam, mas pode acontecer, suscitando um desafio restaurador. O objetivo deste caso clínico é relatar a reabilitação estética de uma menina de 8 anos de idade com molares e incisivos acometidos pela HMI, com grande queixa estética. A criança foi encaminhada à clínica de pesquisa de HMI com duas queixas, sensibilidade e sofrimento de *bullying* devido à “cárie” nos dentes da frente. No exame clínico detectou-se que a criança apresentava HMI severa nos molares e também nos incisivos. Devido à perda de estrutura e exposição de dentina no dente 11, as pessoas falavam para a criança apresentava cárie nos dentes da frente o que incomodava muito aos pais e à criança. Seguindo a filosofia de mínima intervenção os molares foram reabilitados com diferentes recursos e os incisivos com resina composta. Após o tratamento a criança se mostrou extremamente satisfeita e os pais relataram um impacto muito positivo do tratamento no comportamento da criança. Conclui-se que a HMI em dentes anteriores com perda de estrutura pode ser confundida com cárie dando a impressão de negligência com a saúde, afetando pais e criança, sendo a reabilitação desses casos fundamental para restabelecer um convívio social harmônico.