



São Paulo,
27 a 30 de outubro de 2015

67º CBEn®
CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM

4º CLAHEn
COLÓQUIO LATINOAMERICANO DE HISTÓRIA
DA ENFERMAGEM



Para onde Caminha a Enfermagem Brasileira?

ISSN: 2319-0086

ANAIIS



São Paulo,
27 a 30 de outubro de 2015

67º CBEn®
CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM



4º CLAHEn
COLÓQUIO LATINOAMERICANO DE HISTÓRIA
DA ENFERMAGEM

Para onde Caminha a Enfermagem Brasileira?

ISSN: 2319-0086

IDENTIFICAÇÃO DO CONSENSO ENTRE AS MULHERES RELATIVO AOS DESFECHOS PERINEAIS NO PARTO

NATALIE VEIGA MUNIZ ZANFORLIN¹; NATHALIE LEISTER¹; RAFAEL CLEISON SILVA DOS SANTOS²; MARIA LUIZA GONZALEZ RIESCO¹

1. ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP, SAO PAULO, SP, BRASIL; 2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ, MACAPA, AP, BRASIL.

Introdução: O trauma perineal traz prejuízos para a saúde das mulheres como dor, dispureunia, infecção e sangramento. Assim, é importante conhecer as repercussões desta experiência para as mulheres. **Objetivo:** Identificar o consenso entre as mulheres quanto aos desfechos do trauma perineal no parto. **Método:** Estudo observacional, realizado na Maternidade Municipal Eva Zoraide das Dores, Itapecerica da Serra, SP. A amostra de conveniência foi de 50 mulheres com antecedente de trauma perineal em parto vaginal. A coleta de dados foi feita mediante instrumento com 10 perguntas e cinco opções de resposta tipo "escala de Likert", variando de "não é nada importante" a "é o máximo de importante", com pontuação de 1 a 5. Foram aplicadas duas rodadas de entrevistas para cada mulher. A segunda rodada foi aplicada às mesmas mulheres, mantendo-se as perguntas que obtiveram a maior pontuação média na primeira rodada. A pontuação final foi calculada pela média de cada pergunta da segunda rodada, por grupo de mulheres. **Resultados:** Após a análise final, os desfechos avaliados pelas mulheres na segunda rodada, foram classificados em ordem decrescente de importância e os mais importantes foram: não ter infecção nos pontos (média=4,42); ficar satisfeita com a aparência da sua vagina ou períneo (média=4,30); não sentir dor quando voltar a ter relações sexuais (média=4,24); não sentir dor na vagina ou no períneo quando faz xixi ou cocô (média=4,23). **Conclusão:** Os desfechos perineais que obtiveram maior consenso quanto a sua importância foram aqueles relacionados com complicações ou repercussões na saúde perineal em longo prazo, como infecção, dispureunia e estética da região perineal. **Contribuições/implicações para a Enfermagem:** Conhecer o consenso das mulheres é relevante para prevenção e cuidado do trauma perineal.