

Status Profissional: (X) Graduação () Pós-graduação () Profissional

Reabilitação funcional e estética anterior com laminados cerâmicos: um relato de caso

Menezes, T.S.¹; Rombaldo, A. C. C. M.¹ ; Obeid, A. T.¹ ; Velo, M. M. A. C.¹ ; Mondelli, R. F. L.¹

¹Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo

Dentre as diversas alternativas de tratamento, o restabelecimento estético e funcional com as lentes de contato proporciona resultados satisfatórios, quando bem indicadas, planejadas e supervisionadas. Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de uma paciente, do gênero feminino, 56 anos, que buscou atendimento na clínica de especialização em Dentística da Faculdade de Odontologia de Bauru, com queixa principal referente à insatisfação com os dentes anteriores superiores em relação ao tamanho e separação entre eles. Inicialmente, o planejamento foi focado no escurecimento e desgaste dentário por hábito parafuncional, e sugerido a confecção de restaurações diretas ou indiretas dos elementos 13 ao 23. A paciente preferiu a segunda opção com lentes de contato, sendo confeccionado um mock up prévio. O preparo nos dentes foi minimamente invasivo e a hibridização, com ácido fosfórico 37% (Attaque Gel, Biodinâmica) e sistema adesivo (Ambar, FGM). Os laminados cerâmicos, à base de dissilicato de lítio (emax), foram condicionados com ácido fluorídrico (Condac, FGM) por 20s, aplicado silano e adesivo (Ambar, FGM). Cada peça foi cimentada individualmente com o cimento BeutiCem Venner (Shofu), cor A1, e fotoativação por 40s com Valo Cordless (Ultradent). A paciente irá retornar para acompanhamentos periódicos e confecção de uma placa miorrelaxante. O planejamento prévio e pós-tratamento do paciente são etapas críticas, considerando casos de hábito parafuncional. Quando negligenciado, o insucesso poderá ocorrer com a fratura das restaurações. Sendo assim, a paciente deve ser orientada quanto aos riscos e colaboração após a intervenção, para a sua satisfação e sucesso serem atingidos. Portanto, no caso em questão foi possível atingir um sorriso mais harmônico e estético que era o desejado pela paciente, além de restabelecer a função, seguindo o planejamento prévio e pós-tratamento.