

Detalhes da Monografia

Autor(a):	Ano:
Thalita Micheli de Souza	2007
Co-autor 1:	Co-autor 2:
Isabel Cristina Bonadio	
Título:	Title:
CARACTERÍSTICAS DE SAÚDE DE GESTANTES ABRIGADAS EM UMA INSTITUIÇÃO SOCIAL E DE SAÚDE.	HEALTH CHARACTERISTICS OF PREGNANT WOMEN SHELTERED IN A SOCIAL AND HEALTH INSTITUTION
Resumo:	
Em São Paulo, uma instituição social e de saúde acolhe mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade social que enfrentam barreiras para o cuidado pré-natal. Este estudo, transversal, retrospectivo teve o objetivo de descrever a situação de saúde, a atenção pré-natal e os resultados maternos e perinatais de gestantes moradoras do Alojamento Social do Amparo Maternal. Utilizou-se, como fonte de dados, 83 prontuários de gestantes matriculadas no pré-natal no período de julho de 2005 a junho de 2006 que freqüentaram o Serviço de Pré-Natal até o final da gravidez e deram à luz no Amparo Maternal. Os dados obtidos por meio do preenchimento de formulário específico foram processados no programa Epi-Info. A média de idade é 24 anos; 56% possuem até oito anos de estudo; 76% solteiras; brancas e pardas em porcentual igual, 36%, e 22,9% negras; 31,3% primigestas; 42,1% primíparas e 31,3% tiveram abortos anteriores. História de saúde: 37,3% usavam drogas antes e 28% na gravidez. O fumo e o álcool são as mais usadas, tanto antes quanto durante a gravidez; 45,8% haviam realizado citologia oncológica previamente à gestação; 53,0% possuíam estado nutricional adequado; 30% referiram patologias prévias, sendo depressão 24%, hipertensão arterial sistêmica 20% e infecção urinária 20%. Pré-Natal: 44,5% iniciaram o pré-natal com idade gestacional $\geq$ 27 semanas e realizaram em média 5,74 consultas; 78,3% tiveram intercorrências na gestação, 58,5% leucorréia; 46,2% infecção urinária; 21,7% anemia; 3% toxoplasmose e 1,2% sífilis. Na última consulta 55,5% tinham estado nutricional inadequado. Resultados gestacionais: 53% partos normais; 68,7% recém-nascidos a termo; 79,5% recém-nascidos com peso normal; Apgar de 1º e 5º minutos $\geq$ sete, 78,3% e 85,5%, respectivamente. Conhecer características de saúde das gestantes abrigadas no Amparo forneceu subsídios importantes para melhoria da atenção pré-natal a ser oferecida.	
Summary:	
Women face barriers of prenatal care, particularly in situations of unintended pregnancies, or economic difficulties. In São Paulo, Brazil, a social and health institution welcomes pregnant women in situation of social vulnerability. This cross-sectional study, retrospective aimed to describe the state of health, prenatal care and maternal and perinatal outcomes in pregnant inhabitants of Amparo Maternal Social housing. Data source was 83 records of pregnant women enrolled in the prenatal care from July 2005 to June 2006 who attended the service until the end of pregnancy, and gave birth in Amparo Maternal Hospital. Data was analyzed using Epi-Info database program. Results: the average age was 24 years, 56% studied almost eight years, 76% were single; 36% were white and medium brown and 22.9% were black; 31.3% were in a first pregnancy, 42.1% primiparous and 31.3% had miscarriage. History of health: 37.3% used drugs before pregnancy and 28% after pregnancy. The use of alcohol and tabagism were frequently used, both before and during pregnancy, 45.8% had Pap smear exam prior pregnancy; 53.0% had adequate nutritional status, 30% reported prior diseases, and 24% reported depression, 20% had high blood pressure and systemic urinary infection. Prenatal care: 44.5% started the prenatal with gestational age $\geq$ 27 weeks and had 5.7 consultations on average; 78.3% had events in gestation, and 58.5% leucorrhea; urinary infection 46.2%; anemia 21.7%, 3% toxoplasmosis and 1.2% syphilis. In the last appointment 55.5% had inadequate nutritional status. Outcomes: 53% were normal births; 68.7% had newborn babies to term, 79.5% normal weight, Apgar of 1st and 5th minute was $\geq$ seven 78.3% and 85.5% respectively. Knowing the health characteristics of pregnant women sheltered in Amparo Maternal Hospital provided important subsidies to improve prenatal care to be offered.	
Palavra-chave:	Keywords:
nível de saúde, condição social, cuidado pré-natal	Health status, social conditions, prenatal care