

**Status profissional:** (x) Graduação ( ) Pós-graduação ( ) Profissional

**Percepção entre a necessidade de tratamento e o momento da última consulta odontológica em idosos bauruenses, em 2015**

Paiva, F. Z. C.<sup>1</sup>; Pistelli, G. C.<sup>1</sup>; Menezes, A.<sup>1</sup>; Pavani, N.<sup>1</sup>; Martinez, I.<sup>1</sup>; Bastos, R. S.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo.

A população idosa cresceu e os serviços odontológicos não acompanharam esse crescimento adequadamente, consequentemente as condições bucais dos idosos não obtiveram melhorias. O intuito desse estudo foi verificar a necessidade de tratamento e sua associação com o tempo da última consulta odontológica em idosos. Um estudo transversal analítico foi realizado com base num levantamento epidemiológico em saúde bucal em idosos domiciliados realizado em Bauru, em 2015. Foram coletadas informações sobre a percepção de necessidade de tratamento (variável dependente), características sociodemográficas, a fragilidade, a necessidade de próteses dentárias em arco superior e inferior, a dor de dente autorreferida e o acesso a serviço (público/privado, motivo, avaliação), tendo como outra variável dependente o tempo até a última consulta. Foi realizada regressão logística múltipla do tipo backward stepwise ( $p<0,05$ ). Nesta regressão logística múltipla, 326 idosos foram selecionados, 59,1% tinham entre 65 e 74 anos, 56,7% eram mulheres, 27,3% eram frágeis, 44,6% e 42,2% necessitavam de prótese superior e inferior, 17,2% referiram dor em seus dentes, 64,1% foram no serviço privado, 17,3% realizaram tratamento eletivo, a maioria ficou satisfeita com a consulta (82,8%), e 178 realizaram consulta odontológica há menos de 1 ano. Os idosos que relataram necessidade de atendimento ( $OR=0,55$ ;  $0,31:0,98$ ;  $p=0,04$ ), ter idade acima de 74 anos ( $OR=2,48$ ;  $0,27: 1,17$ ;  $p=0,01$ ), ter necessidade de prótese inferior parcial ( $OR=3,14$ ;  $1,40: 7,04$ ;  $p=0,01$ ) ou total ( $OR=3,96$ ;  $2,10: 7,47$ ;  $p=0,01$ ) e a extração (11,05; 3,62: 33,77;  $p=0,01$ ) e outros motivos (11,52; 4,43: 29,93;  $p=0,01$ ) foram associados ao atendimento odontológico de mais de 1 ano do momento do exame epidemiológico. A necessidade de tratamento odontológico no grupo etário dos idosos está fortemente relacionada à extração dentária e a reabilitação protética bucal.