


Doryopteris varians (Raddi) Sm.


Poaceae



Nome popular	polvinho
Grupo Vegetal	Samambaias e Licófitas
Formas de Vida	erva
Substrato	rupícola
Parte Utilizada	folha
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	florestas
Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Lytoneuron lomariaceum (Kunze ex Klotzsch) Yesilyurt

Poaceae




Nome popular	polvinho
Grupo Vegetal	Samambaias e Licófitas
Formas de Vida	erva
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	folha
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	florestas, cerrado
Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

Poaceae



Nome popular	samambaia-mineira	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Samambaias e Licófitas	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	erva	Ambiente	cerrado, campos rupestres
Substrato	terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	folha	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Cephalostemon riedelianus Körn.

Rapateaceae


Nome popular	maria-tochinha, botão-verde, estrela-amarela	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	erva	Ambiente	cerrado, campos rupestres
Substrato	terrícola	Endemismo	Endêmica do Brasil
Parte Utilizada	inflorescência	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Palicourea rigida Kunth


Rubiaceae

Nome popular	chapéu-de-couro	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	arbusto, subarbusto	Ambiente	cerrado, campos rupestres
Substrato	rupícola, terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	folha	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Rudgea viburnoides (Cham.) Benth.


Rubiaceae



Nome popular	folha-congonha
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	arbusto, árvore
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	folha
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	cerrado
Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Esenbeckia decidua Pirani

Rutaceae




Nome popular	mamoninha
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	árvore
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	fruto
Origem	nativa
Ocorrência	BA MG
Ambiente	florestas
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Esenbeckia grandiflora Mart.


Rutaceae

Nome popular	mamoninha	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	arbusto, árvore, subarbusto	Ambiente	florestas
Substrato	terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	fruto	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Esenbeckia irwiniana Kaastra


Rutaceae



Nome popular	mamoninha
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	arbusto
Substrato	rupícola, terrícola
Parte Utilizada	fruto
Origem	nativa
Ocorrência	MG
Ambiente	cerrado, campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Em perigo (EN)

Metrodorea nigra A.St.-Hil.

Rutaceae



Nome popular	mamoninha
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	árvore
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	fruto
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	florestas, cerrado
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Metrodorea stipularis Mart.

Rutaceae




Nome popular	mamoninha
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	árvore
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	fruto
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	florestas
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Magonia pubescens A.St.-Hil.

Sapindaceae


Nome popular	tingui	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	erva	Ambiente	florestas, cerrado
Substrato	terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	semente, fruto	Estado de Conservação	Menos preocupante (LC)



Sapindus saponaria L.


Sapindaceae

Nome popular	saboneteira	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	árvore	Ambiente	florestas
Substrato	terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	fruto	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Serjania acutidentata Radlk.


Sapindaceae



Nome popular	cachoeira
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	liana
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	semente, fruto
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	florestas, cerrado
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Serjania erecta Radlk.


Sapindaceae



Nome popular	cachoeira
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	arbusto, liana
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	semente, fruto
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	cerrado
Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Serjania fuscifolia Radlk.


Sapindaceae



Nome popular	cachoeira
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	liana
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	semente, fruto
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	florestas
Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Serjania laxiflora Radlk.


Sapindaceae



Nome popular	cachoeira
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	liana
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	semente, fruto
Origem	nativa
Ocorrência	MG
Ambiente	florestas, campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Serjania lethalis A.St.-Hil.

Sapindaceae




Nome popular	cipó
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	liana
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	caule
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	florestas, cerrado
Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Serjania multiflora Cambess.


Sapindaceae

Nome popular	cipó	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	liana	Ambiente	cerrado, campos rupestres
Substrato	terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	caule	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Serjania paradoxa Radlk.

Sapindaceae



Nome popular	cachoeira
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	liana
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	semente, fruto
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	cerrado, campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Serjania purpurascens Radlk.


Sapindaceae



Nome popular	cachoeira
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	liana
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	semente, fruto
Origem	nativa
Ocorrência	Sudeste
Ambiente	cerrado
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Serjania pyramidata Radlk.


Sapindaceae



Nome popular	cachoeira
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	liana
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	semente, fruto
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	cerrado
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Serjania reticulata Cambess.

Sapindaceae




Nome popular	cachoeira
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	liana
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	semente, fruto
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	cerrado, campos rupestres
Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Thinouia compressa Radlk.

Sapindaceae


Nome popular	cipó	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	arbusto, liana	Ambiente	florestas
Substrato	terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	caule	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk.

Sapotaceae


Nome popular	coco-peludo (pessego-do-cerrado)	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	árvore	Ambiente	cerrado
Substrato	terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	fruto	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Smilax goyazana A.DC.


Smilacaceae

Nome popular	folha-toco	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	arbusto, liana	Ambiente	florestas, campos rupestres
Substrato	terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	folha	Estado de Conservação	Menos preocupante (LC)



Campylopus dichrostis (Müll.Hal.) Paris

Sphagnaceae




Nome popular	musgo-verde
Grupo Vegetal	Musgo
Formas de Vida	coxim, folhosa
Substrato	rupícola, terrícola
Parte Utilizada	parte aérea inteira
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	cerrado, campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Sphagnum billbuckii H.A.Crum

Sapotaceae


Nome popular	musgo-branco	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Musgo	Ocorrência	MG
Formas de Vida	coxim, tufo	Ambiente	florestas, campos rupestres
Substrato	rupícola, terrícola	Endemismo	Endêmica do Brasil
Parte Utilizada	parte aérea inteira	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.

Sphagnaceae


Nome popular	musgo-branco	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Musgo	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	coxim, folhosa, tufo	Ambiente	florestas, campos rupestres
Substrato	terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	parte aérea inteira	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.


Sphagnaceae

Nome popular	musgo-vermelho	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Musgo	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	folhosa, tapete	Ambiente	florestas, cerrado, campos rupestres
Substrato	rupícola, terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	parte aérea inteira	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Sphagnum longistolo Müll.

Sphagnaceae




Nome popular	musgo-branco
Grupo Vegetal	Musgo
Formas de Vida	folhosa, tufo
Substrato	rupícola, terrícola
Parte Utilizada	parte aérea inteira
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	florestas, campos rupestres
Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Sphagnum palustre L.

Sphagnaceae


Nome popular	musgo-branco	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Musgo	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	coxim, folhosa, tufo	Ambiente	florestas, cerrado, campos rupestres
Substrato	rupícola, terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	parte aérea inteira	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Sphagnum perichaetiale Hampe

Sphagnaceae


Nome popular	musgo-vermelho	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Musgo	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	coxim, folhosa, tufo	Ambiente	florestas, cerrado, campos rupestres
Substrato	rupícola, terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	parte aérea inteira	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Phenakospermum guyannense (A.Rich.) Endl. ex Miq.

Strelitziaceae

Nome popular	sororoca	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	amazônica
Formas de Vida	erva	Ambiente	florestas
Substrato	terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	inflorescência, fruto	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Vellozia spp.

Velloziaceae



Nome popular canela-de-ema, canelinha, árvore-da-pedra

Grupo Vegetal Angiosperma

Formas de Vida dracenóide

Substrato terrícola, rupícola

Parte Utilizada caule, parte aérea inteira

Origem nativa

Ocorrência sem informação

Ambiente -

Endemismo sem informação

Estado de Conservação sem informação

Aloysia sp.

Verbenaceae

Nome popular

"lemon-verbena"

Origem

nativa

Grupo Vegetal

Angiosperma

Ocorrência

sem informação

Formas de Vida

arbusto, subarbusto

Ambiente

-

Substrato

terrícola

Endemismo

sem informação

Parte Utilizada


folha

Estado de Conservação

sem informação

Callisthene major Mart.

Vochysiaceae



Nome popular jacarezinho

Grupo Vegetal Angiosperma

Formas de Vida árvore

Substrato rupícola, terrícola

Parte Utilizada fruto

Origem nativa

Ocorrência ampla


Ambiente cerrado, campos rupestres

Endemismo Endêmica do Brasil

Estado de Conservação Não Avaliada (NE)

Qualea cordata Spreng.

Vochysiaceae




Nome popular	pau-terra-fechado
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	árvore
Substrato	terrácola
Parte Utilizada	fruto
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	cerrado
Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Qualea dichotoma (Mart.) Warm.

Vochysiaceae


Nome popular	pau-terra-fechado	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	arbusto, árvore	Ambiente	cerrado
Substrato	terrácola	Endemismo	Endêmica do Brasil
Parte Utilizada	caule, fruto	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Qualea grandiflora Mart.

Vochysiaceae


Nome popular	tridente (pau-terra)	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	arbusto, árvore	Ambiente	cerrado
Substrato	terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	fruto	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Qualea multiflora Mart.


Vochysiaceae

Nome popular	pau-terra-estrela	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	arbusto, árvore	Ambiente	cerrado, campos rupestres
Substrato	terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	fruto	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Qualea parviflora Mart.

Vochysiaceae



Nome popular pau-terra-fechado

Grupo Vegetal Angiosperma

Formas de Vida arbusto, árvore

Substrato terrícola

Parte Utilizada fruto

Origem nativa

Ocorrência ampla

Ambiente cerrado


Endemismo Não é endêmica do Brasil

Estado de Conservação Não Avaliada (NE)

Salvertia convallariodora A.St.-Hil.


Vochysiaceae

Nome popular	bate-caixa	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	árvore	Ambiente	cerrado
Substrato	terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	fruto	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Vochysia acuminata Bong.


Vochysiaceae



Nome popular	cinzeirinho, cinzeiro
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	árvore
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	fruto
Origem	nativa
Ocorrência	BA MG
Ambiente	cerrado, campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Vochysia discolor Warm.


Vochysiaceae



Nome popular	cinzeirinho, cinzeiro
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	arbusto, árvore
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	fruto
Origem	nativa
Ocorrência	MG
Ambiente	cerrado, campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Vochysia elliptica Mart.

Vochysiaceae



Nome popular cinzeirinho, cinzeiro

Grupo Vegetal Angiosperma

Formas de Vida arbusto, árvore

Substrato terrícola

Parte Utilizada fruto

Origem nativa

Ocorrência ampla


Ambiente cerrado

Endemismo Endêmica do Brasil

Estado de Conservação Não Avaliada (NE)

Vochysia emarginata Vahl

Vochysiaceae



Nome popular cinzeirinho, cinzeiro

Grupo Vegetal Angiosperma

Formas de Vida árvore

Substrato terrícola

Parte Utilizada fruto

Origem nativa

Ocorrência ampla


Ambiente florestas, cerrado, campos rupestres

Endemismo Endêmica do Brasil

Estado de Conservação Não Avaliada (NE)

Vochysia thyrsoidea Pohl

Vochysiaceae




Nome popular	cinzeirinho, cinzeiro
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	árvore
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	fruto
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	cerrado, campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Vochysia tucanorum Mart.

Vochysiaceae


Nome popular	cinzeirinho, cinzeiro	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	árvore	Ambiente	florestas, cerrado
Substrato	terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	fruto	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Abolboda poarchon Seub.


Xyridaceae

Nome popular	azulinha	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	árvore	Ambiente	veredas, campos rupestres
Substrato	terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	inflorescência	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Xyris asperula Mart.


Xyridaceae



Nome popular	-
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Xyris bialata Malme


Xyridaceae



Nome popular	-
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Dados insuficientes (DD)

Xyris ciliata Thunb.

Xyridaceae




Nome popular	botão-marrom
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Xyris cipoensis L.B.Sm. & Downs


Xyridaceae

Nome popular	coroinha	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	MG
Formas de Vida	erva	Ambiente	campos rupestres
Substrato	terrícola	Endemismo	Endêmica do Brasil
Parte Utilizada	inflorescência	Estado de Conservação	Em perigo (EN)



Xyris coutensis Wand. & Cerati


Xyridaceae



Nome popular	cacau, cacau-coroa
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	MG
Ambiente	campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Criticamente em Perigo (CR)

Xyris insignis L.A.Nilsson

Xyridaceae



Nome popular

-

Grupo Vegetal

Angiosperma

Formas de Vida

erva

Substrato

terrícola

Parte Utilizada

inflorescência

Origem

nativa

Ocorrência

MG

Ambiente

campos rupestres

Endemismo


Endêmica do Brasil

Estado de Conservação

Não Avaliada (NE)

Xyris jupicai Rich.

Xyridaceae



Nome popular

-

Grupo Vegetal

Angiosperma

Formas de Vida

erva

Substrato

aquática, terrícola

Parte Utilizada

inflorescência

Origem

nativa

Ocorrência

ampla

Ambiente

cerrado, veredas,
campos rupestres

Endemismo


Não é endêmica do Brasil

Estado de Conservação

Não Avaliada (NE)

Xyris macrocephala Vahl

Xyridaceae




Nome popular	botão-marrom
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	terrácola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil

Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)
-----------------------	-------------------

Xyris nigra N.Mota & Wand.

Xyridaceae




Nome popular	-
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	terrácola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	MG
Ambiente	campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil

Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)
-----------------------	-------------------

Xyris nigricans Alb. Nilsson

Xyridaceae




Nome popular	botão-coroa
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	MG
Ambiente	campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil

Estado de Conservação
Críticamente em Perigo (CR)

Xyris peregrina Malme

Xyridaceae




Nome popular	mundial
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	BA MG
Ambiente	campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil

Estado de Conservação
Não Avaliada (NE)

Xyris pilosa Kunth

Xyridaceae



Nome popular

neve

Grupo Vegetal

Angiosperma

Formas de Vida

erva

Substrato

terrícola

Parte Utilizada

inflorescência

Origem

nativa

Ocorrência

MG

Ambiente

campos rupestres

Endemismo


Endêmica do Brasil

Estado de Conservação

Em perigo (EN)

Xyris platystachya L.A.Nilsson ex Malme

Xyridaceae



Nome popular

cabeça

Grupo Vegetal

Angiosperma

Formas de Vida

erva

Substrato

terrícola

Parte Utilizada

inflorescência

Origem

nativa

Ocorrência

MG

Ambiente

campos rupestres

Endemismo

Endêmica do Brasil


Estado de Conservação

Criticamente em Perigo (CR)



Xyris pterygoblephara Steud.


Xyridaceae



Nome popular	-
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	BA MG
Ambiente	cerrado, campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Xyris roraimae Malme


Xyridaceae



Nome popular	bico-de-ouro
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	cerrado, veredas, campos rupestres
Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Xyris schizachne Mart.


Xyridaceae



Nome popular	-
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	cerrado, campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Xyris spectabilis Mart.


Xyridaceae



Nome popular	botão-marrom
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	MG
Ambiente	campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Em perigo (EN)

Xyris subsetigera Malme


Xyridaceae



Nome popular	pimentinha
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	MG
Ambiente	campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Em perigo (EN)

Xyris trachyphylla Mart.

Xyridaceae



Nome popular	-
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	cerrado, campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Menos preocupante (LC)



Realização



Instituição Parceira



Apoio

