

Lip lift: rejuvenescimento labial – um relato de caso

Ghiotto, K.¹; Marques, M. M.R¹ ; Ribas, T.; Stoppa, S.L.¹; Levy, F. M ²; Souza , A.C.R ¹.

¹ UniCPO- Universidade

² Faculdade de Odontologia de Bauru -USP

O objetivo desse relato de caso foi descrever a técnica cirúrgica de Lip lift podendo ser associada a outros tratamentos. Paciente, JF, leucoderma, 68 anos, insatisfeita com o sorriso e aspecto envelhecido. O planejamento ofertado foi a cirurgia de Lip lift, uma vez que este procedimento cirúrgico diminui o ergotriângulo, everte o lábio e aumenta a exposição dentária, foi realizado o planejamento através da avaliação fotográfica e posteriormente foi realizada marcação, ressecção do excesso labial e sutura. A técnica foi realizada na região de columela e base nasal sem envolver a mucosa. Para o procedimento cirúrgico foram selecionadas lâminas de bisturi 15 C, pinça Adson e pinça Dente de Rato, tesouras, gaze e fios Nylon blue 6.0, 5.0, e Vicryl 5.0. A técnica foi através de incisão em pele com bisturi 15C e como o comprimento da faixa de lábio superior em repouso totalizava em 24mm da base nasal até o vermelhão seco, no ponto mais central do estômago, foi planejada a remoção da faixa de pele do lábio superior, de acordo com as medidas individualizadas para a paciente. A dissecção incluiu a ressecção da espessura total da pele e em cunha do tecido até o subcutâneo. Foi observado no tratamento cirúrgico de Lip lift a diminuição da faixa de altura, bem como melhora na projeção e eversão do lábio superior. Houve edema e eritema compatíveis com a manipulação tecidual transitórios, onde foi associado a aplicação de laser. Fora realizado curativo com MicroporeMR 3M, prescrição medicamentosa com Dexametasona 4mg 06/06h durante 03 dias e de Ceclor de 750mg de 12/12h durante 07 dias, (Via Oral) . A conclusão desse relato mostrou que com um planejamento de tratamento adequado, individualmente, a estética do lábio superior pode ser melhorada. O Lip lift permitiu que o lábio superior fornecesse exposição dentária, uma aparência mais atraente na vista frontal e projeção lateral. Os resultados encorajadores do presente estudo de caso justificam estudos adicionais com mais pacientes.