

63

TRACIONAMENTO DE INCISIVO CENTRAL SUPERIOR IMPACTADO
UTILIZANDO APARELHO ORTODÔNTICO REMOVÍVELSTRIPARI JM¹, Silva CC¹, Valarelli DP¹, Sartori IC², Oliveira TM³, Valarelli FP¹

OBJETIVO: Este trabalho tem o objetivo de ilustrar o tratamento de uma paciente de 8 anos que apresentava uma impactação do incisivo central superior direito por causa de um odontoma simples na região. **RELATO CLÍNICO/EXPERIÊNCIA:** A paciente foi submetida à intervenção cirúrgica para remoção do odontoma e simultaneamente à colagem de acessório ortodôntico no elemento impactado, possibilitando assim o tracionamento do mesmo por meio de um aparelho removível. O tratamento inicial preventivo durou 9 meses. Após a fase de dentadura mista, foi instalado aparelho ortodôntico fixo para alinhamento e nivelamento dos dentes com duração de 2 anos e controle após 1 ano do término do tratamento. Ao final do tratamento, a paciente obteve uma oclusão satisfatória estaticamente e funcionalmente com o incisivo central em posição normal. **CONCLUSÃO:** Quando detectado um odontoma na região dos incisivos superiores deve ser realizada a extração dessa barreira mecânica para que haja o irrompimento normal dos dentes no primeiro período transitório. Isso possibilitará uma oclusão normal com os incisivos em posição ao final do tratamento.