

Status Profissional: (X) Graduação () Pós-graduação () Profissional

Mucocele labial por mordiscamento: relato de caso

Nonoyama, E. A. H.¹; Méndez, D. A. C.¹; Poiani, J. G. R.¹; Aguirre, P. E. A.¹; Lourenço Neto, N.¹; Cruvinel, T.¹;

¹Department of Pediatric Dentistry, Orthodontics and Public Health, Bauru School of Dentistry, University of São Paulo.

A mucocele é um distúrbio comum das glândulas salivares. Principalmente as glândulas salivares menores localizadas no lábio inferior são passíveis de lesões provocadas por traumas de mordiscamento em crianças e adultos jovens. Estas lesões ocorrem devido ao acúmulo de muco decorrente do rompimento do ducto, limitando a correta secreção para a cavidade bucal. O diagnóstico é clínico devido à sua apresentação patognomônica com confirmação histopatológica. O aspecto clínico corresponde a lesões superficiais, arredondadas, indolores e de cor similar da mucosa labial. O presente trabalho tem como objetivo relatar o caso clínico de remoção cirúrgica de uma lesão de mucocele labial. Paciente de 4 anos de idade compareceu junto com a responsável na clínica de odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Bauru FOB-USP, relatando um aumento de volume na mucosa do lábio inferior na região esquerda. No exame intraoral foi constatada uma lesão bolhosa, circunscrita e de base séssil, sem sintomatologia, com aproximadamente 3 mm de diâmetro, mole a palpação e de superfície lisa. O diagnóstico presuntivo da lesão foi mucocele. O tratamento estabelecido foi a remoção cirúrgica de toda a lesão. Foi realizada a anestesia tópica e infiltrativa adjacente à região da lesão. Após a isquemia da lesão, foi realizado o pinçamento da sua base com uma pinça mosquito seguida da incisão com lâmina de bisturi para posteriormente realizar a sutura. A lesão foi encaminhada para análise histopatológica relatando presença de muco circunscrito por uma camada de tecido conjuntivo e presença de glândulas salivares acessórias, confirmado o diagnóstico de mucocele. Após 7 dias, foi realizada a remoção da sutura observando-se aspectos cicatriciais normais. A remoção cirúrgica convencional é o método mais comum para tratar mucocele.