



67º Congresso Brasileiro de Enfermagem <http://67cben2015.com.br> (<http://67cben2015.com.br>)

ISSN 23190086

2149 - HIPOGLICEMIA TRANSITÓRIA EM NEONATOS INTERNADOS EM HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA

PATRÍCIA DE FREITAS; AMÉLIA FUMIKO KIMURA.

ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.

Palavras-chave: Hipoglicemia neonatal; amamentação ; Hospital Amigo da Criança

Introdução: A ocorrência de hipoglicemia transitória é pouco estudada em neonatos internados em Hospital Amigo da Criança (HAC). Assim, é necessário caracterizar o perfil de neonatos que desenvolvem este distúrbio metabólico adaptativo a fim de identificar os fatores preditores desta ocorrência durante o período adaptativo neonatal e, assim, minimizar os riscos de agravos à saúde no período precoce da vida. **Objetivo:** O estudo analisou a associação das características antropométricas, clínicas e comportamentais de recém-nascidos submetidos ao controle de glicemia capilar nas primeiras 24 horas de vida com a ocorrência de hipoglicemia em neonatos internados em unidade de alojamento conjunto de um Hospital Amigo da Criança e verificou as condutas implementadas aos neonatos com diagnóstico de hipoglicemia transitória. **Método:** Estudo transversal realizado com 381 neonatos internados em um hospital escola da cidade de São Paulo. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição campo da pesquisa (CEP -HU/USP: 794/08; SISNEP-CAAE: 0006.0.198.196-08). **Resultados:** Quanto aos neonatos estudados, 210 (55,1%) eram masculinos; 92 (50,4%) brancos; 359 (94,2%) tiveram índice de Apgar > 7 no primeiro minuto de vida; 330 (92,4%) com peso > 2.500g; 289 (83,0%), amamentados na primeira hora de vida, 18 (4,7%) apresentaram diagnóstico de hipoglicemia neonatal e destes, 16 (88,9%) foram transferidos à unidade neonatal. O tremor foi o sinal mais frequente apresentado pelos neonatos com diagnóstico de hipoglicemia, 10 (66,7%). **Conclusões:** A prevalência de hipoglicemia transitória encontrada foi menor do que a descrita na literatura, possivelmente atribuída ao aleitamento materno exclusivo e de livre demanda adotados pelos HAC.