

44 O TRATAMENTO DA MORDIDA ABERTA ANTERIOR NO PACIENTE COM PADRÃO FACIAL VERTICAL SEVERO

Oliveira KR, Oliveira BAS, Patel MP, Sartori IC, Oliveira TM, Valarelli FP

OBJETIVO: O objetivo desse trabalho foi mostrar um caso clínico de um paciente com 27 anos, padrão vertical severo, mordida aberta anterior, má oclusão de Classe II, apinhamento severo e biprotrusão. **RELATO CLÍNICO/EXPERIÊNCIA:** Foi realizado tratamento compensatório por meio de extrações dentárias. Iniciou-se o tratamento com as extrações dos dentes 16, 24, 34 e 45, retração inicial de canino, alinhamento, nivelamento, fechamento dos espaços, elásticos intermaxilares para correção da mordida aberta anterior e má oclusão da Classe II. Ao final do tratamento foi instalado uma placa de Hawley superior com orifício na papila incisiva para auxiliar na melhora do posicionamento da lingual, sendo um elemento recordatório importante para a estabilidade em longo prazo. **CONCLUSÃO:** A opção de tratamento escolhida apresentou-se extremamente satisfatória, permitindo o trespasso vertical anterior positivo, dentes alinhados, bom selamento labial e uma grande melhora do perfil facial. As extrações dentárias trouxeram uma melhora significante no perfil facial e na dissolução do apinhamento dentário.