

Diferentes tipos de planejamento para aumento de coroa clínica estético – série de casos

Rosa, I.M.B.¹; Pavani, A.P.S.²; Sant'Ana, A.C.P.¹; Zangrando, M.S.R.¹; Greghi, S.L.A.¹; Damante, C.A.¹

¹Departamento de Prótese e Periodontia, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo.

²Centro de Pós-graduação em Odontologia.

Na odontologia moderna a busca de um sorriso estético e harmonioso corresponde às expectativas e demandas estéticas atuais. Assim, o tratamento periodontal hoje não está relacionado apenas com a saúde, mas abrange também procedimentos estéticos. Uma das cirurgias periodontais bastante realizada com tal finalidade é o aumento de coroa clínica estético (ACCE), que consiste em maior exposição das coroas dentárias através de remoção gengival, utilizando incisão em bisel interno, associada ao remodelamento ósseo, por meio de osteotomia e osteoplastia. O objetivo do presente trabalho é relatar uma série de casos para ilustrar diferentes formas de planejamento para o ACCE. Paciente LGGP, 23 anos, masculino, queixa de dentes curtos aparecendo muita gengiva. Exame radiográfico sugeriu espaço biológico inadequado, sendo confirmada a presença de erupção passiva e ativa alteradas (EPAA) durante o procedimento cirúrgico. Paciente BPC, 21 anos, feminino, queixa de sorriso infantil pela presença de dentes curtos e exposição gengival em excesso. Exame tomográfico revelou EPAA, servindo como referência para quantidade necessária de remoção tanto de tecido mole quanto de tecido duro durante a cirurgia. Paciente SAOS, 48 anos, feminino, queixa de deficiência estética dentária, além de sorriso gengival. Após enceramento diagnóstico para realização de facetas, foi confeccionada uma placa acrílica para ser utilizada como guia cirúrgico. Paciente LPF, 54 anos, feminino, queixa de diferença de tamanho dos dentes anteriores superiores buscou tratamento com a finalidade de melhorar o sorriso. Fotografias intrabucais foram tomadas para o planejamento digital, o qual guiou tanto o tratamento cirúrgico periodontal como o tratamento restaurador estético posteriormente. A resolução cirúrgica periodontal para o ACCE pode, portanto, ser direcionada por várias formas de planejamento, sendo o mais importante para um adequado desfecho de cada caso a realização de um correto diagnóstico.