


Agave sisalana Perrine ex Engelm.

Asparagaceae

Nome popular	sisal	Origem	exótica
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	sem informação
Formas de Vida	erva	Ambiente	-
Substrato	rupícola, terrícola	Endemismo	Exótica
Parte Utilizada	caule, fibra	Estado de Conservação	Não Aplicável (NA)

Achyrocline alata (Kunth) DC.

Asteraceae




Nome popular	macela-amarela
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	inflorescência, parte aérea inteira
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	cerrado, campos rupestres
Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Achyrocline satureioides (Lam.) DC.

Asteraceae

Nome popular	macela-branca, macela-amarela	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	erva	Ambiente	cerrado, campos rupestres
Substrato	terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	inflorescência, parte aérea inteira	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Baccharis elliptica Gardner


Asteraceae

Nome popular	-	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	BA MG
Formas de Vida	arbusto, subarbusto	Ambiente	campos rupestres
Substrato	rupícola, terrícola	Endemismo	Endêmica do Brasil
Parte Utilizada	parte aérea inteira	Estado de Conservação	Em perigo (EN)



Chromolaena asperima (Sch.Bip. ex Baker)
R.M.King & H.Rob.


Asteraceae



Nome popular	capim-roxinha
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	arbusto
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	parte aérea inteira
Origem	nativa
Ocorrência	Ampla
Ambiente	cerrado
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Chromolaena barbacensis (Hieron.) R.M.King
& H.Rob.


Asteraceae



Nome popular	capim-roxinha
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	arbusto
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	parte aérea inteira
Origem	nativa
Ocorrência	Sudeste e Sul
Ambiente	cerrado, campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Menos preocupante (LC)

Chromolaena barrosoae R.M.King & H.Rob.

Asteraceae




Nome popular	capim-roxinha
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva, subarbusto
Substrato	rupícola, terrícola
Parte Utilizada	parte aérea inteira
Origem	nativa
Ocorrência	MG
Ambiente	campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Chromolaena cylindrocephala (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.


Asteraceae



Nome popular	capim-roxinha
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	arbusto, subarbusto
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	parte aérea inteira
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	cerrado, campos rupestres, antrópico
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Chromolaena horminoides DC.

Asteraceae



Nome popular capim-roxinha

Grupo Vegetal Angiosperma

Formas de Vida subarbusto

Substrato terrícola

Parte Utilizada parte aérea inteira

Origem nativa

Ocorrência ampla


Ambiente cerrado, campos rupestres

Endemismo Endêmica do Brasil

Estado de Conservação Não Avaliada (NE)

Chromolaena multiflosculosa (DC.) R.M.King & H.Rob.

Asteraceae



Nome popular capim-roxinha

Grupo Vegetal Angiosperma

Formas de Vida subarbusto

Substrato terrícola

Parte Utilizada parte aérea inteira

Origem nativa

Ocorrência MG


Ambiente cerrado, campos rupestres

Endemismo Endêmica do Brasil

Estado de Conservação Não Avaliada (NE)

Chromolaena pedalis (Sch.Bip. ex Baker)
R.M.King & H.Rob.


Asteraceae



Nome popular	capim-roxinha
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	subarbusto
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	parte aérea inteira
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	cerrado, campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Chromolaena sagittifera (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.

Asteraceae




Nome popular	capim-roxinha
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	subarbusto
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	parte aérea inteira
Origem	nativa
Ocorrência	MG
Ambiente	-
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Dasyphyllum reticulatum (DC.) Cabrera


Asteraceae

Nome popular	marapuamba	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	MG
Formas de Vida	arbusto	Ambiente	campos rupestres
Substrato	terrícola	Endemismo	Endêmica do Brasil
Parte Utilizada	inflorescência, parte aérea inteira	Estado de Conservação	Quase ameaçada (NT)



Dasyphyllum trichophyllum (Baker) Cabrera

Asteraceae




Nome popular	marapuamba (similar)
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	arbusto
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	parte aérea inteira
Origem	nativa
Ocorrência	MG
Ambiente	campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Vulnerável (VU)

Eremanthus erythropappus (DC.) MacLeish


Asteraceae

Nome popular	candeia	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	árvore	Ambiente	florestas, cerrado, campos rupestres
Substrato	terrícola	Endemismo	Endêmica do Brasil
Parte Utilizada	caule	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Eremanthus glomerulatus Less.


Asteraceae



Nome popular	candeia
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	árvore
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	caule
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	cerrado, campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Eremanthus incanus (Less.) Less.


Asteraceae



Nome popular	candeia
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	árvore
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	caule
Origem	nativa
Ocorrência	BA MG
Ambiente	florestas, cerrado, campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Eremanthus polycephalus (DC.) MacLeish

Asteraceae



Nome popular	candeia
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	árvore
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	caule
Origem	nativa
Ocorrência	MG
Ambiente	cerrado, campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Vulnerável (VU)

Eupatorium spp.


Asteraceae

Nome popular	vassourinha	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	sem informação
Formas de Vida	arbusto	Ambiente	-
Substrato	terrícola	Endemismo	sem informação
Parte Utilizada	parte aérea inteira	Estado de Conservação	sem informação

Lychnophora diamantinana Coile & Jones


Asteraceae

Nome popular	panã, paina	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	MG
Formas de Vida	arbusto	Ambiente	antrópico
Substrato	terrícola	Endemismo	Endêmica do Brasil
Parte Utilizada	caule, folha	Estado de Conservação	Em perigo (EN)



Lychnophora ericoides Mart.

Asteraceae




Nome popular	arnica
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	arbusto
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	caule, folha
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Quase ameaçada (NT)

Lychnophora villosissima Mart.


Asteraceae

Nome popular	panã, flor de paina	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	MG
Formas de Vida	arbusto	Ambiente	campos rupestres
Substrato	terrícola	Endemismo	Endêmica do Brasil
Parte Utilizada	inflorescência, caule, folha	Estado de Conservação	Em perigo (EN)



Proteopsis argentea Mart. & Zucc. ex Sch.Bip.


Asteraceae



Nome popular	-
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	BA MG
Ambiente	campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Vulnerável (VU)

Symphyopappus brasiliensis (Gardner) R.M.King & H.Rob.


Asteraceae



Nome popular	chuvisco-clara
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	subarbusto
Substrato	rupícola, terrícola
Parte Utilizada	parte aérea inteira
Origem	nativa
Ocorrência	MG
Ambiente	cerrado, campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Symphyopappus decussatus Turcz.

Asteraceae




Nome popular	capim assa-peixe
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	arbusto
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	parte aérea inteira
Origem	nativa
Ocorrência	BA MG
Ambiente	cerrado, campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Vernonanthura polyanthes (Sprengel) Vega & Dematteis

Asteraceae


Nome popular	capim assa-peixe	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	arbusto	Ambiente	cerrado, campos rupestres
Substrato	terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	parte aérea inteira	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Wunderlichia mirabilis Riedel.


Asteraceae

Nome popular	imbiruçu	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	arbusto	Ambiente	campos rupestres
Substrato	rupícola, terrícola	Endemismo	Endêmica do Brasil
Parte Utilizada	inflorescência	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Wunderlichia senae Glaz. ex Maguire & G.M.Barroso

Asteraceae



Nome popular	imbiruçu
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	arbusto
Substrato	rupícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	MG
Ambiente	cerrado, campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Em perigo (EN)

Xerochrysum bracteatum (Vent.) Tzvelev

Asteraceae


Nome popular	"strawflowers", sempre-viva	Origem	cultivada
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	sem informação
Formas de Vida	subarbusto	Ambiente	antrópico
Substrato	terrícola	Endemismo	Exótica
Parte Utilizada	inflorescência	Estado de Conservação	Não Aplicável (NA)



Amphilophium crucigerum (L.) L.G.Lohmann.


Bignoniaceae

Nome popular	pente-de-macaco, pente-de-onça	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	liana	Ambiente	florestas
Substrato	terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	fruto	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Amphilophium mansoanum (DC.) L.G.Lohmann

Bignoniaceae




Nome popular	pente-de-macaco, pente-de-onça
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	liana
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	fruto
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	florestas
Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Amphilophium paniculatum (L.) Kunth


Bignoniaceae

Nome popular	pente-de-macaco, pente-de-onça	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	liana	Ambiente	florestas
Substrato	terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	fruto	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Anemopaegma acutifolium A.DC.


Bignoniaceae



Nome popular	asa-de-barata
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	arbusto
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	fruto
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	cerrado, antrópico
Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Anemopaegma album Mart. ex DC.

Bignoniaceae



Nome popular asa-de-barata

Grupo Vegetal Angiosperma

Formas de Vida arbusto

Substrato terrícola

Parte Utilizada fruto

Origem nativa

Ocorrência ampla

Ambiente cerrado

Endemismo Não é endêmica do Brasil

Estado de Conservação Não Avaliada (NE)

Anemopaegma arvense (Vell.) Stellf. ex de Souza

Bignoniaceae

Nome popular asa-de-barata

Grupo Vegetal Angiosperma

Formas de Vida arbusto

Substrato terrícola

Parte Utilizada fruto


Origem nativa

Ocorrência ampla

Ambiente cerrado


Endemismo Não é endêmica do Brasil

Estado de Conservação Em perigo (EN)



Anemopaegma glaucum Mart. ex DC.


Bignoniaceae



Nome popular	asa-de-barata
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	arbusto
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	fruto
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	cerrado
Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Anemopaegma gracile Bureau & K.Schum.

Bignoniaceae



Nome popular	asa-de-barata
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	liana
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	fruto
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	florestas, cerrado
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Anemopaegma heringeri J.C.Gomes

Bignoniaceae

Nome popular	asa-de-barata	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	MG
Formas de Vida	liana	Ambiente	florestas, cerrado
Substrato	terrícola	Endemismo	Endêmica do Brasil
Parte Utilizada	fruto	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Anemopaegma laeve DC.

Bignoniaceae



Nome popular	asa-de-barata
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	liana
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	fruto
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	cerrado
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Callichlamys latifolia (Rich.) K. Schum.

Bignoniaceae



Nome popular	cipó
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	liana
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	caule
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	florestas
Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Crescentia cujete L.


Bignoniaceae

Nome popular	coité, cabaça	Origem	cultivada
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	sem informação
Formas de Vida	árvore	Ambiente	antrópico
Substrato	terrícola	Endemismo	Exótica
Parte Utilizada	fruto	Estado de Conservação	Não Aplicável (NA)



Cuspidaria lachnaea (Bureau) L.G.Lohmann

Bignoniaceae



Nome popular asa-de-barata

Grupo Vegetal Angiosperma

Formas de Vida liana

Substrato terrícola

Parte Utilizada fruto

Origem nativa

Ocorrência ampla


Ambiente florestas

Endemismo Não é endêmica do Brasil

Estado de Conservação Não Avaliada (NE)

Cuspidaria pulchra (Cham.) L.G.Lohmann

Bignoniaceae



Nome popular asa-de-barata

Grupo Vegetal Angiosperma

Formas de Vida arbusto

Substrato terrícola

Parte Utilizada fruto

Origem nativa

Ocorrência ampla


Ambiente cerrado, campos rupestres

Endemismo Não é endêmica do Brasil

Estado de Conservação Não Avaliada (NE)

Cuspidaria sceptrum (Cham.) L.G.Lohmann

Bignoniaceae



Nome popular asa-de-barata

Grupo Vegetal Angiosperma

Formas de Vida liana

Substrato terrícola

Parte Utilizada fruto

Origem nativa

Ocorrência ampla

Ambiente cerrado, campos rupestres

Endemismo Não é endêmica do Brasil

Estado de Conservação Não Avaliada (NE)

Cybistax antisiphilitica (Mart.) Mart.

Bignoniaceae

Nome popular sete-sangria

Grupo Vegetal Angiosperma

Formas de Vida árvore

Substrato terrícola

Parte Utilizada fruto


Origem nativa

Ocorrência ampla

Ambiente florestas


Endemismo Não é endêmica do Brasil

Estado de Conservação Não Avaliada (NE)



Fridericia bahiensis (Schauer) L.G.Lohmann

Bignoniaceae



Nome popular asa-de-barata

Grupo Vegetal Angiosperma

Formas de Vida arbusto, árvore

Substrato terrícola

Parte Utilizada fruto

Origem nativa

Ocorrência ampla


Ambiente cerrado, campos rupestres

Endemismo Endêmica do Brasil

Estado de Conservação Não Avaliada (NE)

Fridericia formosa (Bureau) L.G.Lohmann

Bignoniaceae



Nome popular asa-de-barata

Grupo Vegetal Angiosperma

Formas de Vida liana

Substrato terrícola

Parte Utilizada fruto

Origem nativa

Ocorrência ampla


Ambiente florestas, cerrado

Endemismo Endêmica do Brasil

Estado de Conservação Não Avaliada (NE)

Fridericia platyphylla (Cham.) L.G.Lohmann

Bignoniaceae



Nome popular asa-de-barata

Grupo Vegetal Angiosperma

Formas de Vida arbusto, liana

Substrato terrícola

Parte Utilizada fruto

Origem nativa

Ocorrência ampla


Ambiente cerrado

Endemismo Não é endêmica do Brasil

Estado de Conservação Não Avaliada (NE)

Fridericia samydoides (Cham.) L.G.Lohmann

Bignoniaceae



Nome popular asa-de-barata

Grupo Vegetal Angiosperma

Formas de Vida liana

Substrato terrícola

Parte Utilizada fruto

Origem nativa

Ocorrência ampla

Ambiente florestas, cerrado


Endemismo Não é endêmica do Brasil

Estado de Conservação Não Avaliada (NE)

Jacaranda brasiliana (Lam.) Pers.

Bignoniaceae


Nome popular	boca-de-sapo	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	árvore	Ambiente	florestas, cerrado
Substrato	terrícola	Endemismo	Endêmica do Brasil
Parte Utilizada	fruto	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Jacaranda caroba (Vell.) A.DC.

Bignoniaceae


Nome popular	asa-de-barata	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	arbusto	Ambiente	cerrado
Substrato	terrícola	Endemismo	Endêmica do Brasil
Parte Utilizada	fruto	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don


Bignoniaceae

Nome popular	pará-pará pequeno e grande	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	amazônica
Formas de Vida	árvore	Ambiente	florestas
Substrato	terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	fruto	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Jacaranda cuspidifolia Mart. ex A.DC.


Bignoniaceae



Nome popular	boca-de-sapo
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	árvore
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	fruto
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	cerrado
Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Jacaranda macrantha Cham.


Bignoniaceae



Nome popular	-
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	árvore
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	fruto
Origem	nativa
Ocorrência	Sudeste
Ambiente	florestas
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Menos preocupante (LC)

Jacaranda micrantha Cham.

Bignoniaceae



Nome popular	boca-de-sapo
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	árvore
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	fruto
Origem	nativa
Ocorrência	Sul-Sudeste
Ambiente	florestas
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Jacaranda mimosifolia D. Don


Bignoniaceae

Nome popular	castanhola (jacarandá-mimoso)	Origem	cultivada
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	sem informação
Formas de Vida	árvore	Ambiente	antrópico
Substrato	terrícola	Endemismo	Exótica
Parte Utilizada	fruto	Estado de Conservação	Não Aplicável (NA)



Jacaranda oxyphylla Cham.

Bignoniaceae




Nome popular	caroba
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	arbusto
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	fruto
Origem	nativa
Ocorrência	Sul-Sudeste
Ambiente	cerrado
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Jacaranda paucifoliolata Mart. ex DC.

Bignoniaceae


Nome popular	castanhola	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	GO MG
Formas de Vida	arbusto	Ambiente	cerrado
Substrato	terrícola	Endemismo	Endêmica do Brasil
Parte Utilizada	fruto	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Jacaranda puberula Cham.


Bignoniaceae

Nome popular	asa-de-barata
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	árvore
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	fruto
Origem	nativa
Ocorrência	Sudeste
Ambiente	florestas, cerrado
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Menos preocupante (LC)



Jacaranda pulcherrima Morawetz

Bignoniaceae



Nome popular	caroba
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	árvore
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	fruto
Origem	nativa
Ocorrência	Sudeste
Ambiente	cerrado
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Jacaranda racemosa Cham

Bignoniaceae




Nome popular	caroba
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	arbusto
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	fruto
Origem	nativa
Ocorrência	GO MG
Ambiente	campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Menos preocupante (LC)

Zeyheria montana Mart.

Bignoniaceae


Nome popular	bolsa-de-pastor; pente-de-onça	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	arbusto, árvore	Ambiente	cerrado, campos rupestres
Substrato	terrícola	Endemismo	Endêmica do Brasil
Parte Utilizada	fruto	Estado de Conservação	Menos preocupante (LC)



Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl. L

Bignoniaceae


Nome popular	bolsa-de-pastor	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	árvore	Ambiente	florestas
Substrato	terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	fruto	Estado de Conservação	Vulnerável (VU)



Bixa orellana L.

Bixaceae


Nome popular	urucum	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	arbusto, árvore	Ambiente	florestas, cerrado, antrópico
Substrato	terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	fruto	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Cochlospermum orinocense (Kunth) Steud.

Bixaceae


Nome popular	rosa-de-tefé	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	amazônica
Formas de Vida	árvore	Ambiente	florestas
Substrato	terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	fruto	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Telmatoblechnum serrulatum (Rich.) Perrie, D.J. Ohlsen & Brownsey


Blechnaceae

Nome popular	samambaia	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Samambaias e Licófitas	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	erva	Ambiente	florestas, cerrado, campos rupestres
Substrato	terrícola	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	caule	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker


Bromeliaceae



Nome popular	gravatá
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	epífita, rupícola, terrícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	florestas, cerrado, campos rupestres
Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Menos preocupante (LC)

Aechmea phanerophlebia Baker.


Bromeliaceae



Nome popular	gravatá
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	epífita, rupícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	Sudeste
Ambiente	florestas, cerrado, campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Alcantarea duarteana (L.B.Sm.) J.R. Grant

Bromeliaceae




Nome popular	-
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	rupícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	MG (endêmica restrita)
Ambiente	campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Em perigo (EN)



Alcantarea hatschbachii (L.B.Sm. & Read) Leme


Bromeliaceae



Nome popular	-
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	rupícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	MG
Ambiente	campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Dados insuficientes (DD)

Alcantarea turgida Versieux & Wand.


Bromeliaceae



Nome popular	-
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	rupícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	MG (endêmica restrita)
Ambiente	campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Bromelia balansae Mez


Bromeliaceae



Nome popular	ananás, gravatá
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	cerrado, antrópico
Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Menos preocupante (LC)

Bromelia lindmanii Mez


Bromeliaceae



Nome popular	ananás, gravatá
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	terrícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	MG
Ambiente	cerrado
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Dyckia diamantina (Forzza) Forzza


Bromeliaceae



Nome popular	gravatá
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	rupícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	MG
Ambiente	campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Dyckia magalhaesii (L.B.Sm.) Forzza

Bromeliaceae



Nome popular	gravatá
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	rupícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	MG
Ambiente	campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Dyckia minarum Mez


Bromeliaceae



Nome popular	gravatá
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	rupícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	ampla
Ambiente	campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Menos preocupante (LC)

Dyckia reflexa (Forzza & Wand.) Forzza

Bromeliaceae




Nome popular	gravatá
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	rupícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	MG
Ambiente	campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Dados insuficientes (DD)

Dyckia spectabilis (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Baker


Bromeliaceae

Nome popular	cirius	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	Nordeste
Formas de Vida	erva	Ambiente	campos rupestres
Substrato	rupícola	Endemismo	Endêmica do Brasil
Parte Utilizada	inflorescência	Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)



Dyckia subsecunda Baker

Bromeliaceae




Nome popular	gravatá
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	rupícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	MG
Ambiente	campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)

Tillandsia usneoides (L.) L.


Bromeliaceae

Nome popular	barba-de-velho	Origem	nativa
Grupo Vegetal	Angiosperma	Ocorrência	ampla
Formas de Vida	erva	Ambiente	florestas, cerrado, campos rupestres
Substrato	epífita	Endemismo	Não é endêmica do Brasil
Parte Utilizada	parte aérea inteira	Estado de Conservação	Menos preocupante (LC)



Vriesea cipoensis O.B.C.Ribeiro et al.

Bromeliaceae



Nome popular	gravatá
Grupo Vegetal	Angiosperma
Formas de Vida	erva
Substrato	rupícola
Parte Utilizada	inflorescência
Origem	nativa
Ocorrência	MG
Ambiente	campos rupestres
Endemismo	Endêmica do Brasil
Estado de Conservação	Não Avaliada (NE)