

67º Congresso Brasileiro de Enfermagem <http://67cben2015.com.br> (<http://67cben2015.com.br>)

ISSN 23190086

**1460 - MANIFESTAÇÕES ATÍPICAS DA SÍNDROME CORONARIANA AGUDA EM IDOSOS:
REVISÃO SISTEMÁTICA**

MARIANA TEREZA MONFERDINI RUOCO¹; FERNANDA AYACHE NISHI²; DINÁ DE ALMEIDA LOPES MONTEIRO DA CRUZ³; RITA DE CASSIA GENGO E SILVA⁴.

1.HOSPITAL DO CORAÇÃO DE CAMPINAS, CAMPINAS - SP - BRASIL; 2.HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL; 3,4.ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO - SP - BRASIL.

Palavras-chave: Síndrome Coronariana Aguda; Sinais e Sintomas; Idoso

Introdução: A prevalência de Síndrome Coronariana Aguda (SCA) é elevada em todo o mundo e aumenta com o envelhecimento. Enfermeiros devem reconhecer as manifestações clínicas de SCA, especialmente, quando realizam triagem. Em idosos, a SCA pode se manifestar de forma atípica, podendo retardar o diagnóstico e comprometer o prognóstico. Embora estudos primários relatem a ocorrência das manifestações atípicas em idosos, não há dados sobre a avaliação da qualidade metodológica, tampouco síntese de seus resultados. **Objetivo:** Sintetizar dados de literatura acerca da ocorrência de manifestações atípicas da SCA em idosos. **Método:** Revisão sistemática que incluiu estudos experimentais ou observacionais de abordagem quantitativa, sem restrição de idiomas, publicados entre 2003-2014. Utilizou-se a estratégia PICO para elaborar as buscas em bases eletrônicas: Medline/Pubmed, CINAHL, Lilacs e Google Scholar. A avaliação da qualidade metodológica foi realizada a partir da concordância de 45% com os itens do STROBE e a extração dos dados, por instrumento elaborado pelas pesquisadoras. Realizou-se a síntese narrativa, pois a heterogeneidade dos dados não permitiu conduzir metanálise. **Resultados:** Foram incluídos seis estudos. Todos atenderam ao critério de qualidade metodológica. Quatro evidenciaram associação entre idade e manifestações atípicas, sendo a dispneia o sintoma atípico mais frequente. **Conclusão:** Não há consenso na literatura acerca da associação entre idade e manifestações atípicas. Em idosos, as manifestações atípicas ocorreram com maior frequência e a mais comum foi a dispneia. **Implicações:** Há necessidade de realização de outros estudos primários para esclarecer a relação entre idade e manifestações atípicas. Porém, os resultados dessa revisão sugerem que enfermeiros em serviços de triagem devem estar atentos às manifestações atípicas de SCA na população idosa. **Referência:** Mozaffarian D et al. Heart Disease and Stroke Statistics – 2015 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2015; 131:e29-e322.
