

Detalhes da Monografia

Autor(a):	Ano:
Debora Ugayama Bassi	2005
Co-autor 1:	Co-autor 2:
Silvia Regina Secoli	
Título:	Title:
INTERAÇÃO MEDICAMENTOSAS POTENCIAIS: UMA ANÁLISE DO APRAZAMENTO REALIZADO PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM.	POTENCIAL DRUG INTERACTION: ANALYSIS OF ANALGESIC ADMINISTRATION SCHEDULING BY NURSES.
Resumo:	
Verificar a frequência de horários com maior concentração de medicamentos aprazados e, analisar a frequência e a ocorrência de aprazamento concomitante de medicamentos com ações sinérgicas, antagônicas e com potencial para alteração de absorção, distribuição, biotransformação e excreção Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, transversal, cuja casuística foi composta por 260 prescrições médicas de pacientes hemorroidectomizados, hospitalizados no período de 2002 a 2004, em hospital privado da cidade de São Paulo. O sistema de classificação de medicamento utilizado foi o Alfa. Os dados foram analisados através de estatística descritiva. Resultados: Houve predomínio de pacientes do sexo feminino (54,6%), que não possuíam doenças pré-existentes (64,2%), que faziam uso de medicação em casa (54,2%). A média de idade foi 44,4 anos, a média de agentes prescritos foi de 4,08, a média de associações foi de 1,14 por paciente. Quanto ao aprazamento, 56,3% dos medicamentos ocorreram no turno da noite, destacando-se o horário das 20:00 (29,0%) e 24:00 (28,6%). Dentre as associações por classes terapêuticas destacou-se a Antiinflamatórios não esteroidais (AI) associados a Protetores a mucosa gástrica (Dau) AI + Dau (7,4%), interação que provoca sinergismo proporcionado pela proteção da mucosa gástrica pelo Dau, enquanto que o AI oferece como efeito indesejável a epigastralgia, cujos principais representantes foram a dipirona e o omeprazol com 68,2%. Seguido pelo AI+AI (6,2%) que podem proporcionar ao paciente maximização da toxicidade. Conclusões: Algumas associações são desejáveis enquanto classes terapêuticas, todavia se esses medicamentos forem co-administrados (devido ao aprazamento simultâneo) podem gerar efeitos indesejáveis, resultando em atraso da resposta analgésica e ocorrência de epigastralgia. Desta forma, o conhecimento da enfermeira, sobre os medicamentos, é fundamental para o aprazamento adequado e a maximização da analgesia.	
Summary:	
To verify the frequency of schedules with bigger convened medicine concentration and, to analyze the frequency and the occurrence of concomitant scheduling of concomitant medicines with synergic actions, antagonistic and with potential to change absorption, distribution, biotransformation and excretion Methods: It is about a descriptive, transversal study, whose casuistry was composed for 260 medical lapsings of patients that made hemorrhoidectomy's surgery, hospitalized in the period of 2002 the 2004, in private hospital in São Paulo. The system that made the medicine classification was Alpha. The data had been analyzed through descriptive statistics. It had predominance of patients of the feminine sex (54,6%), that preexisting illnesses did not possuíam (64,2%), that they made medication use in house (54,2%). The age average was 44,4 years, the average of prescribed agents was of 4,08, the average of associations was of 1,14 for patient. How much to the aprazamento, 56.3% of medicines had occurred in the turn of the night, being distinguished the schedule of 20:00 (29,0%) and 24:00 (28,6%). Amongst the associations for therapeutical classrooms it was distinguished not esteroidais Antiinflamatórios (AI) associates the Protectors the gastric mucosa (Dau) AI + Dau (7,4%), interaction that provokes proportionate sinergismo for the protection of the gastric mucosa for the Dau, while that the AI offers as undesirable effect the epigastralgia, whose main representatives had been dipiron and omeprazole with 68,2%. Followed for the AI+AI (6,2%) that they can provide to the patient the increase of the toxicity. Conclusions: Some associations are desirable while therapeutical classrooms, however if these medicines co-will be managed (had to the simultaneous scheduling) can generate effect undesirable, resulting in delay of the analgesic reply and occurrence of gastroduodenal injury. Of this form, the knowledge of the nurse, on medicines, is basic for the adequate scheduling and the increase of the analgesy.	
Palavra-chave:	Keywords:
Aprazamento, interação medicamentosa, polifarmácia, enfermagem.	Drug interaction, scheduling, polipharmacy, nursing.

