

## **Lesão reacional mimetizando desordem potencialmente maligna em ventre de língua**

Vinícius Lima Sabbag<sup>1</sup> (0009-0008-8171-4983), Kaique Alberto Preto<sup>1</sup> (0000-0001- 6991-209X), Gabriela Lopes dos Santos<sup>1</sup> (0000-0001-9976-9511), Marcelo Junior Zanda<sup>2</sup> (0000-0001-7519-5285), Denise Oliveira Tostes<sup>1</sup> (0000-0002-4628-7129)

<sup>1</sup> Departamento de Cirurgia, Estomatologia, Patologia e Radiologia, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, Bauru, São Paulo, Brasil

<sup>2</sup>Centro de Pesquisa Clínica, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, Bauru, São Paulo, Brasil

Muitas lesões orais brancas sem fatores causais locais evidentes podem mimetizar clinicamente desordens potencialmente malignas e seus diagnósticos podem ser desafiadores. O objetivo desse trabalho é apresentar um caso clínico de uma lesão branca reacional que foi, inicialmente, diagnosticada como uma desordem potencialmente maligna. Paciente do sexo feminino, 30 anos, não tabagista, encaminhada ao cirurgião dentista com queixa de placa branca com duração de um ano, não destacável, com limites bem definidos, superfície verrucosa, de aspecto e coloração uniforme, assintomática, de aproximadamente 1,5 cm de diâmetro em ventre de língua. Nenhuma causa local ou sistêmica foi associada a lesão. O diagnóstico presuntivo foi de leucoplasia. Foi realizada uma biópsia excisional, sendo o material encaminhado para análise histopatológica. Microscopicamente, observou-se mucosa bucal constituída por epitélio estratificado pavimentoso hiperplásico com intensa hiperparaqueratose e projeções papilares proeminentes, cristas epiteliais alongadas, sem sinais de displasia epitelial. Subjacentemente, no tecido conjuntivo fibroso, observou-se macrófagos volumosos com citoplasma espumoso (células de xantoma), concentrados nas papilas do tecido conjuntivo e intenso infiltrado inflamatório mononuclear. Com base nas características microscópicas, o diagnóstico final foi de xantoma verruciforme. O paciente foi orientado sobre o seu diagnóstico e, após seis meses de acompanhamento, não houve sinais de recidiva. Embora de ocorrência incomum, o xantoma verruciforme é uma lesão reacional pouco conhecida pelos cirurgiões-dentistas que deve ser incluída ao diagnóstico diferencial de lesões brancas potencialmente malignas da mucosa oral, principalmente quando afeta regiões com maior risco de desenvolvimento de câncer bucal.

**Fomento:** CAPES (001)