

SISA 2021
Online

III Seminário Internacional em Saúde do Adulto

*"Práticas avançadas em enfermagem: como
estamos e para onde vamos?"*

Anais do III SISA 2021

PROESA

PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO

Apoio



Todos os resumos publicados neste Anais foram reproduzidos a partir dos textos fornecidos por seus autores. O conteúdo dos resumos é de inteira responsabilidade dos respectivos autores. A EEUSP, a Comissão Organizadora do III SISA e os pareceristas não são responsáveis pelas consequências do uso dos dados publicados nesses resumos.

Catálogo na Publicação (CIP)

Biblioteca “Wanda de Aguiar Horta”

Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo

S471a

Seminário Internacional em Saúde do Adulto (3. : 2021 : São Paulo, SP)

Anais do III SISA / Programa de Pós-Graduação em Enfermagem na Saúde do Adulto – São Paulo : EE/USP, 2021.
111 p.

Título do Seminário: Práticas avançadas em enfermagem: como estamos e para onde vamos?

1. Prática Avançada de Enfermagem. 2. Saúde do Adulto. 3. Enfermagem Médico-Cirúrgica. I. Título.

CDD: 610.73



25. EFICÁCIA DO TRATAMENTO TÓPICO PARA O CONTROLE DA DOR EM FERIDA NEOPLÁSTICA MALIGNA EM ADULTOS: REVISÃO SISTEMÁTICA

SUZANA APARECIDA DA COSTA FERREIRA, YESLY JOHANA RINCÓN TORRES, CAROL VIVIANA SERNA GONZÁLEZ, VERA LÚCIA CONCEIÇÃO DE GOUVEIA SANTOS, SANDRA GUERRERO GAMBOA (suzanaenfer@gmail.com)

RESUMO: Introdução: 14,5% dos pacientes com câncer apresentam Feridas Neoplásicas Malignas (FNM)¹ e 85% relatam dor na ferida². Na prática clínica, este é o sintoma com menos intervenções de tratamentos tópicos. Objetivo: Sintetizar a evidência disponível relacionada à eficácia do tratamento tópico para o controle da dor em FNM em adultos em comparação com o tratamento padrão. Método: Revisão sistemática de eficácia, seguindo a metodologia do JBI^{®3}. Foram pesquisados estudos em inglês, português e espanhol e sem delimitação de tempo por meio de revisão por dois pesquisadores e extração de dados em instrumento próprio. A avaliação da qualidade metodológica foi realizada utilizando o instrumento do JBI[®]. Resultados: Dos 814 artigos restaram 663 registros após a remoção de duplicatas e desses 653 foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão e/ou atenderem aos critérios de exclusão. Dez publicações foram consideradas elegíveis para leitura na íntegra. Após a avaliação da qualidade metodológica, quatro artigos foram incluídos nesta revisão. Dois estudos corresponderam a opioides e anestésicos⁵, desenvolvidos especificamente para o manejo da dor em FNM que apresentam resultados positivos no controle da dor e os outros dois corresponderam a substâncias antimicrobianas, que foram desenvolvidos para o controle de sintomas em FNM, incluindo dor, e não teve piora no escore de dor durante o estudo sendo considerado como efeito positivo no controle da dor em FNM. Discussão: Os estudos são escassos e há necessidade de desenvolvê-los com melhor qualidade metodológica. Além disso, apenas uma publicação foi desenvolvida na América Latina. Conclusão: Para controle da dor em FNM associada a troca de curativo ou excesso de exsudato pode-se usar anestésico tópico (lidocaína a 5% e creme de prilocaína); na dor secundária ao edema ou crescimento acelerado do tumor, um analgésico opioide tópico (morfina tópica 0,2%) e na dor associada à infecção da ferida, um antisséptico ou antimicrobiano tópico. Implicações para a Enfermagem: A dor da ferida muitas vezes é vista como uma consequência inevitável de viver com uma ferida crônica, como uma FNM, mas esse mito deve ser vencido. O tratamento tópico para o controle da dor em FNM é fundamental e nos apresenta o desafio de fortalecer o conhecimento e a prática clínica de enfermagem que afetam o cuidado e o bem-estar do paciente. Os dados, aqui apresentados, nos mostram possibilidades de controle da dor em FNM, bem como as lacunas de pesquisa para futuras investigações que embasem os cuidados a estes pacientes.

PALAVRAS-CHAVE/DESCRITORES: Dor; Ferida Neoplásica Maligna; Administração Tópica; Enfermagem; Estomaterapia.