

3174449 A EXPERIÊNCIA DA ENFERMAGEM CENTRALIZANDO O PROCESSO DE CUIDADO NA TERAPIA INTENSIVA

Autores:

Rute Cândida Pereira ; Rute Cândida Pereira ; Rosana Anita da Silva Fonseca ; Rosana Anita da Silva Fonseca ; Andréa Barros de Magalhães ; Andréa Barros de Magalhães ; Priscilla Cândida Pereira Izidoro de Araújo ; Priscilla Cândida Pereira Izidoro de Araújo ; Lucas Lopes Antunes ; Lucas Lopes Antunes ; Arthur Filipe Maranhão Barbosa da Silva ; Arthur Filipe Maranhão Barbosa da Silva ; Emanuelle Caires Dias Araújo Nunes ; Emanuelle Caires Dias Araújo Nunes ; Regina Szylit ; Regina Szylit ; Emanuelle Caires Dias Araújo Nunes ; Emanuelle Caires Dias Araújo Nunes

Resumo:

Fortificação das farinhas de milho e de trigo com ferro. Introdução: a deficiência de ferro é um problema de saúde pública, atinge cerca de dois bilhões de pessoas no mundo¹, acomete prioritariamente grupos de crianças, mulheres e gestantes, podendo desencadear anemia ferropriva. Objetivo: avaliar o cumprimento da legislação sobre fortificação de farinhas de milho e trigo com ferro. Método: estudo descritivo, quantitativo, com amostra por conveniência, e levantamento de dados em cinco cidades e quinze mercados de Pernambuco. Nas embalagens dos produtos de farinha de trigo e milho foram observadas o cumprimento ou não do registro de fortificação com ferro. Resultado: nos 39 (100%) produtos pesquisados de diferentes marcas de farinha de milho e 20 (100%) das marcas de farinha de trigo, foi verificado que em 29 (74%), não foram fortificadas, e 20 (100%) foram fortificadas, respectivamente. Conclusão: a farinha de milho foi fortificada com ferro em apenas 26% dos produtos encontrados no comércio, paradoxalmente, todas as farinhas de trigo pesquisadas estavam fortificadas. Observou-se descumprimento da norma técnica adotada no Brasil desde 2002². Contribuições: alertar para a necessidade de fiscalização no cumprimento das políticas públicas de saúde e intensificação de cuidados de prevenção à deficiência de ferro e anemia ferropriva de grupos populacionais mais vulneráveis. Descritores: Deficiência de Ferro, Anemia Ferropriva, Políticas Públicas de Saúde. 1. Cançado RD, Chiattone CS. Anemia ferropênica no adulto; causas, diagnóstico e tratamento. Rev Bras Hematol Hemoter, 2010; 32:240-246. 2. ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Legislação em vigilância sanitária. Resolução RDC n° 344, de 13 de dezembro de 2002: aprova o regulamento técnico para a fortificação das farinhas de trigo e das farinhas de milho com ferro e ácido fólico. Diário Oficial da União [DOU] 2002 dez 13.

Referências:

Boff L. O cuidado necessário. 2a Ed. Petrópolis-RJ: Vozes. 2013. Blumer H. Symbolic Interactionism: perspective and method. California: University of California Press, 1969.