

**Status Profissional:** (X) Graduação ( ) Pós-graduação ( ) Profissional

**Lesão labial hiperplásica em criança causada por hábito nocivo de sucção**

Anizi, M.V.<sup>1</sup>; Freitas-Filho, S.A.J.<sup>1</sup>; Moraes, A.L.S.<sup>2</sup>; SOUZA, A.<sup>2</sup>; Oliveira, D.T.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Departamento de Cirurgia, Estomatologia, Patologia e Radiologia, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo

<sup>2</sup>Especialização em Odontopediatria, Faculdades Integradas do Norte de Minas (Funorte), Unidade de Juiz de Fora

A sucção dos lábios é um hábito nocivo à saúde do paciente, podendo causar alterações na dentição, na musculatura peribucal e na oclusão. Este trabalho tem como objetivo apresentar uma lesão hiperplásica em uma criança induzida pela sucção do lábio superior. Uma menina de 11 anos de idade foi encaminhada a clínica odontológica para avaliação de um nódulo na região interna do lábio superior. Na anamnese, a mãe relatou que a paciente tinha o vício de “chupar o dedo” desde muito pequena e que a lesão do lábio estava prejudicando sua fala e seu sorriso. Ao exame físico intrabucal, observou-se uma lesão arredondada de consistência firme e de coloração normal, assintomática, localizada na parte interna do lábio superior recobrimo parcialmente a coroa do dente 11 que estava irrompendo no rebordo alveolar. Notou-se também, que a paciente apresentava mordida aberta anterior e atresia da maxila. Uma biópsia excisional foi realizada, sob anestesia local, e a amostra encaminhada para análise histopatológica. Os cortes microscópicos revelaram mucosa bucal constituída por epitélio estratificado pavimentoso paraqueratinizado hiperplásico e acantótico. Ademais, subjacente havia tecido conjuntivo densamente colagenizado com focos de infiltrado inflamatório mononuclear. O diagnóstico estabelecido foi de hiperplasia fibrosa inflamatória. A paciente e seus responsáveis foram informados do diagnóstico e da etiologia da lesão, além de orientados que o abandono da sucção do lábio superior era necessário para prevenir a recidiva da lesão. Este caso clínico reforça que, os hábitos nocivos como a sucção do lábio podem induzir respostas hiperplásicas da mucosa bucal em crianças, sendo a conscientização da criança e da família, por um profissional de saúde, essencial para a promoção da saúde bucal e a prevenção da recidiva da lesão.