

Importância do controle periódico do paciente com Síndrome de Gorlin na detecção precoce de queratocistos odontogênicos

Francisco, E.L.¹; Preto, K. A.¹; Santos, G. L.¹; Trindade P. A. K.2 ; Oliveira, D. T.¹

¹ Departamento de Cirurgia, Estomatologia, Patologia e Radiologia, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo

² Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais – Bauru - Universidade de São Paulo

Os queratocistos odontogênicos são lesões benignas que ocorrem nos ossos maxilares, originados de remanescentes da lâmina dentária. Podem ocorrer como um dos sinais da Síndrome de Gorlin ou dos Carcinomas Basocelulares Nevóides e, nestes pacientes apresentam um maior potencial de recidivas quando comparado a outros pacientes não sindrômicos. O objetivo deste trabalho é apresentar o caso clínico de um paciente com síndrome de Gorlin e múltiplos queratocistos recidivantes. Paciente do sexo masculino, 24 anos de idade, com fissura labiopalatina unilateral transforame do lado esquerdo, diagnóstico de síndrome de Gorlin e histórico de queratocistos odontogênicos múltiplos procurou atendimento odontológico para controle clínico-imaginológico dos cistos odontogênicos. Como conduta clínica, foi realizada uma tomografia computadorizada de feixe cônico que demonstrou imagens hipodensas bem delimitadas e corticalizadas em maxila do lado direito (em contato com as raízes dos dentes 16,15 e 14) e em mandíbula (adjacente as raízes do dente 37 e em região retromolar) com ruptura de cortical vestibular. As imagens eram sugestivas de queratocistos odontogênicos recidivantes pois o paciente já havia retirado lesões anteriores nas mesmas localizações. Foi realizada a remoção cirúrgica das duas lesões císticas sendo os materiais encaminhados para análises histopatológicas. Os cortes microscópicos revelaram, para ambas as lesões, presença de cavidade cística virtual revestida por epitélio estratificado pavimentoso paraqueratinizado, com camada basal em paliçada, núcleos hipercromáticos, sem cristas epiteliais e com corrugação superficial, confirmando o diagnóstico de queratocistos odontogênicos. Este relato de caso clínico destaca a importância das avaliações odontológicas periódicas dos pacientes com síndrome de Gorlin, visando a detecção precoce dos queratocistos odontogênicos recidivantes ou não, bem como, de outras manifestações clínicas desta síndrome.

Categoria: CASO CLÍNICO