

Tratamento ortodôntico com extrações atípicas.

Stripari; J.M¹; Yaedú, R. Y. F¹ ; Valarelli, F.P²

¹Departamento de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo.

²Departamento de Ortodontia, Instituto Odontológico de Pós Graduação.

Nos casos de classe II geralmente é indicado a extração de 2 pres-molares superiores para correção da má oclusão ou 4 pré-molares nos casos de apinhamento severo. Deve se considerar que as extrações de outros dentes, denominadas atípicas, podem ser realizadas em alguns casos específicos. O objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico de uma má oclusão de Classe II, onde foram extraídos 4 dentes, sendo estes, dois molares de um lado e dois pré-molares do lado oposto. A paciente apresentava um perfil convexo, dentadura permanente com apinhamento ântero superior e inferior severos. O tratamento foi realizado com a extração de molares devido a lesão cáriosa extensa que apresentava e a falta de espaço para o irrompimento de um dos pré

molares do lado oposto. A extração de um dente extensamente cariado, com problemas endodônticos e/ou periodontais deve sempre ser considerada juntamente com o diagnóstico ortodôntico. Apesar de ter sido extraídos dentes com tamanhos diferentes, a finalização do tratamento foi conseguida sem desvio de linha média, sem alterações significantes no perfil e com satisfação da paciente, obtendo o sucesso do tratamento.