

## Desafio no diagnóstico de lesão verrucosa em lábio inferior

Beijo, J.B.<sup>1</sup>; Santos, G.L.<sup>1</sup>; Zanda, M.J<sup>2</sup>; Oliveira, D.T<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Departamento de Cirurgia, Estomatologia, Patologia e Radiologia, Área de Patologia, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo.

<sup>2</sup>Centro de Pesquisa Clínica, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo.

As lesões benignas verrucosas que ocorrem na boca estão, frequentemente, associadas ao Papilomavírus Humano (HPV) e seu diagnóstico pode ser desafiador. Entre tais lesões temos o condiloma acuminado, doença sexualmente transmissível, que afeta principalmente as regiões genitais, mas, também pode se manifestar em boca. Este trabalho tem como objetivo relatar a ocorrência de uma lesão verrucosa em boca cujo diagnóstico foi estabelecido associando-se as características clínicas e microscópicas. Paciente do sexo masculino, 31 anos compareceu para atendimento odontológico apresentando nódulo em lábio inferior, com superfície verrucosa, base séssil, assintomática, com 4 meses de evolução. Não foram observadas outras lesões intra ou extra-bucal e o paciente negou a presença de lesões em outras partes do corpo. O diagnóstico clínico foi sugestivo de condiloma acuminado. Realizou-se uma biopsia excisional, sendo os espécimes enviados para análise histopatológica. Microscopicamente, foi observada mucosa bucal constituída por epitélio estratificado pavimentoso com abundante queratinização, intensamente hiperplásico, presença de cristas epiteliais alongadas, muitos coilócitos e figuras mitóticas próximas à camada basal. Subjacente no tecido conjuntivo notou-se focos de infiltrado inflamatório mononuclear subepitelial, vasos sanguíneos, congestos, fibras musculares estriadas esqueléticas e feixes neurais. O diagnóstico estabelecido foi de condiloma acuminado. O paciente foi orientado sobre a lesão e o risco de transmissão. O diagnóstico de condiloma acuminado é desafiador para os dentistas e patologistas, uma vez que lesões causadas pelo HPV possuem semelhanças clínicas e histopatológicas. Conclui-se que, a associação das características clínicas e microscópicas é essencial para um diagnóstico preciso das lesões verrucosas que afetam a mucosa bucal sendo imprescindível a orientação do paciente sobre a transmissão das doenças sexualmente transmissíveis como o condiloma acuminado.