

Odontoma composto em região anterior de maxila associado a múltiplas anomalias dentárias: relato de caso

Victoria Ynara Vidal de Souza¹, Anderson Ismael Zumba-Escobar¹, Mitsushi Matsumoto¹, Ángel Terrero-Pérez², Mariela Peralta-Mamani¹ (0000-0002-0243-9194)

¹ Faculdade do Centro Oeste Paulista, Piratininga, São Paulo, Brasil

² Departamento de Cirurgia, Estomatologia Patologia e Radiologia, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, Bauru, São Paulo, Brasil

O odontoma composto (OC) é um tumor odontogênico misto, composto de dentículos, frequentemente diagnosticado como achado incidental durante a avaliação de dentes retidos. O objetivo é apresentar um caso de OC provocando a retenção de um incisivo central e associado com múltiplas anomalias dentárias. Paciente do sexo feminino, 10 anos de idade, chegou à consulta devido à falta de erupção do incisivo central esquerdo (dente 11). Na história médica, não apresentava nenhuma doença sistêmica, nem hábitos. A radiografia panorâmica mostra os dentes 17 e 27 com fusão das raízes, taurodontismo do 16, 26, 37 e 47, agenesia do 15 e 25. Além disso, a presença de uma área radiopaca, bem delimitada com borda radiolúcida, medindo aproximadamente 1 cm de diâmetro, sobreposta parcialmente à borda incisal do dente 21 retido. A tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) mostra duas áreas hiperdensas com densidade similar a dente, com halo hipodenso, localizado na face palatina da borda incisal do dente 21 retido, se estendendo até a crista óssea alveolar. Um deles mede 5.94x4.8x4.62 mm e o outro 2.07x2.75x1.84 mm. Além disso, observa-se aumento do folículo pericoronário do 21, osteoesclerose na região periapical do dente 34 (6.44x7.32 mm) e confirmou-se a todas as anomalias dentárias (agenesia, taurodontismo e fusão radicular). A hipótese diagnóstica foi de OC e anomalias dentárias associadas. A conduta foi a remoção cirúrgica do OC, durante a cirurgia foi visualizado uma cápsula fibrosa e dentro 2 peças com aspecto de dente com alteração de forma. Paciente continua em tratamento ortodôntico e acompanhamento clínico e radiográfico. Neste caso, os pais do paciente foram informados com relação a todos esses achados incidentais. Conclui-se que em pacientes com odontomas é importante realizar uma avaliação de toda a TCFC podendo encontrar mais achados incidentes. O OC pode estar associado a diferentes anomalias dentárias.