

Quarto molar mandibular: relato de caso clínico

Silva, T.K.C.¹; Souza, I.F.¹; Silveira, I.T.T.¹; Mello, M.A.B.²; Barcellos, B.M.²; Yaedu, R.Y.F.^{1,2}

¹Departamento de Cirurgia, Estomatologia, Patologia e Radiologia, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo.

²Departamento de Cirurgia Bucomaxilofacial do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo.

Dente supranumerário é aquele que excede a série normal, podendo ocorrer em ambos os arcos dentários e são classificados de acordo com sua localização e morfologia. Sua etiologia não é completamente entendida. Ocorre mais na dentição permanente e duas vezes mais nos homens que nas mulheres. Conforme sua localização no arco dentário podem ser, paramolares ou distomolares, únicos ou múltiplos e uni ou bilaterais, são geralmente dentes não irrompidos e dimorfos. Paciente do sexo masculino, 21 anos de idade, se apresentou ao serviço de Cirurgia e Traumatologia da Faculdade de Odontologia de Bauru, sem queixa principal, para a extração dos terceiros molares. Na radiografia panorâmica foi detectado a presença de um dente supranumerário, e então realizou-se tomografia computadorizada de feixe cônico, onde foi possível a identificação de um quarto molar, localizado próximo ao ângulo da mandíbula, do lado direito. Apresentava-se não irrompido, mesioangular e em Classe II posição B de Pell & Gregory. A exodontia do terceiro e quarto molar foi realizada em ambulatório, com anestesia local e sem intercorrências. Após a antisepsia intra e extraoral, aposição dos campos operatório e anestesia, realizou-se incisão, descolamento do retalho mucoperiósteo, osteotomia para visualização do supranumerário, odontossecção corono-radicular e sua remoção. Posteriormente, realizou-se curetagem, regularização óssea e irrigação com soro fisiológico 0,9% na loja cirúrgica e sutura passiva do retalho. Após uma semana, a sutura foi removida, não havendo nenhuma complicação pós-operatória. A presença desses dentes pode causar problemas, como falhas na erupção, deslocamento de dentes, apinhamentos, cistos e tumores odontogênicos, a fim de prevenir o favorecimento de complicações e o desenvolvimento de patologias, a exodontia é o tratamento mais indicado. Conclui-se que o cirurgião-dentista deve estar atento à prevalência e localização dos supranumerários, em especial o quarto molar.