

CRONOLOGIA E SEQUÊNCIA DE ERUPÇÃO DE DENTES PERMANENTES EM PACIENTES COM FISSURA COMPLETA BILATERAL DE LÁBIO E PALATO

MUFARREJ TD, Carrara CFC, Neves LT

Setor de Odontopediatria, Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, USP

Objetivos: Estabelecer a cronologia e sequência de erupção de dentes permanentes em indivíduos com fissura completa bilateral de lábio e palato. **Métodos:** Foram examinados 322 pacientes (213 meninos e 109 meninas) na faixa etária de 5 a 14 anos (60 a 179 meses) com fissura completa bilateral de lábio e palato, os quais estão matriculados para tratamento no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais. Foram incluídos apenas indivíduos leucodermas, brasileiros que não apresentavam síndromes. A coleta de dados foi realizada pelo princípio transversal, por meio de exame clínico para análise da erupção dentária e exame radiográfico, associado somente em crianças maiores de 8 anos, com a finalidade de se constatar possíveis agenesias dentárias. **Resultados:** Foi determinado a cronologia e sequência de erupção dos dentes permanentes para este tipo de fissura. O gênero feminino quando comparado ao masculino apresentou uma média de erupção menor e estatisticamente significativa para todos os dentes inferiores. No arco superior, apenas o primeiro pré-molar e o segundo molar erupcionaram, significativamente, mais cedo nas meninas. **Conclusão:** O gênero feminino tende a ser mais precoce na erupção dentária, confirmando a necessidade de normas quantitativas específicas para cada gênero.