

ANOMALIAS DENTÁRIAS DE NÚMERO NA DENTADURA PERMANENTE DE PACIENTES COM E SEM FISSURA LABIOPALATINA

TEREZA GPG**, Costa B***, Carrara CFC***

Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais/USP

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência de anomalias dentárias de número na dentadura permanente de indivíduos com fissura transforame incisivo bilateral e indivíduos sem fissura. Métodos: Foram avaliadas radiografias panorâmicas de 205 indivíduos com fissura (141 do sexo masculino e 64 do sexo feminino) e 185 sem fissura (107 do sexo masculino e 78 do sexo feminino), com idades entre 8 e 18 anos. Resultados: Os resultados obtidos mostraram que da amostra total dos pacientes com fissura 19,02% não apresentou alteração de número, enquanto 70,26% apresentou agenesia dentária e 11,7% dentes supranumerários. O incisivo lateral superior foi o dente mais acometido pela agenesia (81,25%). Para o grupo sem fissura, os resultados mostraram prevalência de 0,54% de supranumerários e 5,4% de agenesia, sendo o segundo pré-molar inferior o dente mais ausente (3,8%). Conclusão: Estes dados contribuem para um melhor conhecimento das condições dentárias específicas deste tipo de fissura, podendo auxiliar no planejamento ortodôntico.