

## **Intervenção breve grupal para redução do uso de risco e nocivo de álcool em usuários de serviços de atenção primária à saúde**

Estudo objetivou verificar a efetividade Intervenção Breve Grupal (IBG) realizada por enfermeiros, na redução do uso de risco e nocivo de álcool em usuários de um serviço de APS. **Método:** Tratou-se de um ensaio clínico, controlado com *follow-up* de 90 dias, realizado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). A amostra foi composta 180 sujeitos que apresentaram pontuação sugestiva de padrão de uso de risco ou nocivo de álcool no AUDIT. Os usuários que foram randomizados para o Grupo Experimental (GE), foram submetidos à IBG, enquanto os indivíduos alocados no Grupo Controle (GC) receberam um folheto informativo sobre problemas relacionados ao consumo nocivo de álcool. Ambos os grupos participaram de uma avaliação de seguimento após 90 dias. A IBG foi composta por quatro sessões grupais, com encontros semanais e uma sessão de seguimento após 90 dias. Para coleta de dados foi aplicado o AUDIT. O modelo linear misto foi utilizado para avaliar a efetividade da IBG na redução do consumo de álcool. O nível de significância adotado foi de 5%. **Resultados:** Dos 180 sujeitos que faziam uso de risco/nocivo de álcool, n=44 completaram todas as fases da pesquisa. O GE apresentou redução estatisticamente significativa ( $p \leq 0,01$ ) de cerca de 10 pontos no escore do AUDIT após a IBG (Antes IBG= $15,89 \pm 6,62$  - uso de risco; Após IBG= $6,40 \pm 5,05$  - uso de baixo risco) mantendo o uso de baixo risco no seguimento ( $6,69 \pm 6,38$  – uso de baixo risco). O GC apresentou redução estatisticamente significativa ( $p \leq 0,01$ ) de cerca de 3 pontos no escore do AUDIT (Antes = $13,11 \pm 4,54$  - uso de risco; Após = $9,83 \pm 5,54$  - uso de risco) voltando ao padrão de uso de álcool semelhante a aquele identificado no início, no seguimento ( $13,00 \pm 5,70$  - uso de risco). As diferenças entre os dois grupos (GE x GC) na redução do consumo foram estatisticamente significativas ( $p \leq 0,01$ ). **Conclusão:** Evidenciou-se que a intervenção breve grupal realizada pelo enfermeiro no contexto da APS foi efetiva para redução do consumo de álcool em indivíduos com padrão de uso de risco/nocivo.

**Palavras-chaves:** Enfermagem em saúde comunitária. Enfermagem em adições. Alcoolismo. Estudos de intervenção. Atenção primária à saúde. Enfermagem