

Abordagem multidisciplinar de agenesia e sorriso gengival

Inácio, G.B.¹; Macedo, A.O.¹; Arraes, R.A.C.¹; Sant'Ana, A.C.P.¹; Zangrando, M.S.R.¹; Damante, C.A.¹

¹Departamento de Prótese e Periodontia, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo.

Ainda que se considere a percepção do belo algo subjetivo e individual, há aspectos relacionados à forma e distribuição que compartilham predileções estéticas em comum na população. É nesse contexto que a correção do sorriso gengival demanda não somente a compreensão das expectativas do paciente, mas também o conhecimento das estruturas que equilibram o sorriso. O caso corresponde a um paciente do sexo masculino, 17 anos de idade e sem doença sistêmica associada que procurou a clínica de Periodontia da FOB-USP para correção de sorriso gengival. Ao exame clínico periodontal foi possível observar exposição de mais de 3 mm de tecido mole, fenótipo espesso festonado e agenesia dos incisivos laterais superiores que foi corrigida previamente com movimentação ortodôntica e reanatomização de caninos. Além disso, verificou-se ausência de harmonia entre os zênites gengivais influenciada pela condição gerada da agenesia. O exame tomográfico revelou o diagnóstico de erupção passiva e ativa alterada, situação a qual tanto a margem gengival como a crista óssea se encontram em posição mais coronal do que o normal. Após terapia de preparo inicial, a cirurgia de aumento de coroa clínica estético foi programada. Primeiramente, marcações de pontos guias foram realizados a fim de que incisões com bisel interno em angulação de 45° e envolvendo as papilas fossem realizadas e o colarinho gengival de tecido excedente pudesse ser removido. Posteriormente, retalho total foi levantado e osteoplastia e osteotomia foram realizadas para devolver arquitetura óssea mais harmônica e correto espaço para a inserção conjuntiva. Após 03 meses, paciente retornou para o pós-operatório satisfeito com o resultado estético e bom processo de cicatrização dos tecidos. O presente caso resgata a importância de um correto diagnóstico, bem como correta aplicação de princípios cirúrgicos importantes para uma maior previsibilidade no resultado final.