

Restabelecimento funcional e estético de incisivos centrais superiores fraturados: relato de caso

Carraro, B.¹; Forcin, L.V.¹, Costa, M.P.¹, Capellan, A.¹, Velo, M.M.A.C.¹, Bombonatti, J.F.S¹

¹ Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos, Faculdade de Odontologia de Bauru – Universidade de São Paulo

Restaurações de fraturas extensas em dentes anteriores representam grandes desafios clínicos, pois, devem englobar uma abordagem conservadora, que devolva a naturalidade do sorriso e que seja funcional. O presente caso clínico descreve o restabelecimento de dentes anteriores fraturados através do emprego de restaurações diretas em resina composta. Paciente do gênero masculino procurou atendimento odontológico na clínica de Dentística da FOB/USP com insatisfação estética e funcional do sorriso, uma vez que havia sido submetido a vários procedimentos restauradores dos dentes ântero-superiores que continuavam a fraturar. Ao exame clínico, não foram observados hábitos posturais ou de sucção, possuindo deglutição e fonação normais. O paciente não relatou hábitos parafuncionais e, durante o diagnóstico clínico, foi observado mordida de topo na região anterior, com fraturas nos dentes 11,12,21 e 22. Uma vez que o paciente não queria realizar tratamento ortodôntico, um enceramento diagnóstico foi realizado, vestibularizando levemente as superfícies para adequar à oclusão do paciente. O protocolo restaurador seguiu os mesmos passos para todos os dentes. Inicialmente, a seleção de cor foi realizada, seguido do isolamento absoluto e confecção do bisel (ponta diamantada nº 3118). Após proteção do complexo dentino-pulpar, foi realizado condicionamento seletivo do esmalte (10 segundos) e aplicação do adesivo Universal (3M ESPE). Após a confecção da face palatina com resina composta para esmalte, a camada de resina para dentina foi inserida (DA2) e a reconstrução dos mamelos dentinários no terço incisal foi realizada. Ao final, foi inserido um incremento único de resina para esmalte cromático e acabamento inicial. Os resultados obtidos e acompanhamento do paciente demonstram a necessidade da integração entre o protocolo restaurador estético com as expectativas do paciente, preservando a manutenção da saúde e função.

Categoria: CASO CLÍNICO