



São Paulo,
27 a 30 de outubro de 2015

67º CBEn[®]
CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM
4º CLAHEEn
COLÓQUIO LATINOAMERICANO DE HISTÓRIA
DA ENFERMAGEM



Para onde Caminha a Enfermagem Brasileira?

ISSN: 2319-0086

ANAIS



São Paulo,
27 a 30 de outubro de 2015

67º CBEn
CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM
4º CLAHEEn
COLÓQUIO LATINOAMERICANO DE HISTÓRIA
DA ENFERMAGEM



Para onde Caminha a Enfermagem Brasileira?

ISSN: 2319-0086

através da frequência absoluta e percentual. Resultados: Constatou-se que 91,91% das parturientes fizeram uso de TNICEO. As mais utilizadas foram: presença do acompanhante observada em 63,43% dos trabalhos de partos e/ou partos, exercícios respiratórios 74,29%, deambulação 30,93%, movimento pélvico 37,23%, o posicionamento em decúbito lateral esquerdo 18,11% e a realização do banho 17,95%. A avaliação pelo (IA) no 1º e 5º minutos de vida do recém-nascido, mostrou-se maior ou igual a 8 (oito) em 93,41% e 99,01% respectivamente para os filhos das mulheres que utilizaram as TNICEO versus 82,78% e 94,74% para os RNs das parturientes que utilizaram AT. Conclusão: A disponibilização de TNICEO pelas EO e sua utilização pelas parturientes durante o processo de parturição repercutiu favoravelmente sobre a vitalidade do RN. O estudo mostrou que o IA > 8 no primeiro e quinto minutos, de vida foi maior, portanto com melhor vitalidade, no grupo de parturientes que utilizaram as TNICEO.

USO DO NURSING ACTIVITIES SCORE EM ONCO-HEMATOLOGIA PARA QUANTIFICAR A CARGA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM
JULIANA BASTONI DA SILVA; SARAH DEANA MOREIRA; ANA PAULA GADANHOTO VIEIRA; KÁTIA GRILLO PADILHA; SILVIA REGINA SECOLI; MARIA HELENA DE MELO LIMA

Introdução: Na área de Onco-Hematologia, o uso de instrumentos que possibilitem a avaliação da carga de trabalho é fundamental. As complicações agudas concorrentes ao câncer e as reações de toxicidade da terapia antineoplásica exigem assistência de enfermagem qualificada e em número adequado¹. Objetivo: Avaliar a carga de trabalho de enfermagem em uma enfermaria de Onco-Hematologia de um hospital de ensino. Método: Coorte prospectiva com 151 pacientes internados de 18/agosto a 18/novembro de 2014; pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética local. Utilizou-se para a coleta de dados uma ficha com informações demográfico-clínicas, e o Nursing Activities Score (NAS). Na análise dos dados foram utilizados