

AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DENTÁRIAS NA DENTADURA DECÍDUA DE PACIENTES COM FISSURA PÓS-FORAME INCISIVO

SILVA TR**, Costa B, Neves LT

Setor de Odontopediatria, Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, USP

Objetivo: Verificar a ocorrência de alterações dentárias na dentadura decídua de pacientes com fissura pós-forame incisivo. **Métodos:** Foram avaliados 49 pacientes com fissura pós-forame incisivo operados, na faixa etária de 3 a 6 anos de idade, regularmente matriculados no HRAC, apresentando dentadura decídua completa, sem histórico de extração anterior e sem distinção de raça e gênero. Para análise das alterações dentárias foi realizado exame clínico intrabucal, em cadeira odontológica sob luz do refletor, sempre pela mesma profissional. No exame foram avaliados: presença de agenesia, supranumerário, alteração de forma, alteração de posição, alteração de estrutura (opacidade e hipoplasia) e os dados foram anotados em ficha clínica previamente elaborada. **Resultados:** Dos 49 pacientes (32 meninas e 17 meninos), 53% (n=26) apresentaram algum tipo de alteração dentária, sendo que 7 deles apresentaram mais de um tipo de anomalia. No grupo total, 17 pacientes apresentaram somente opacidade e 2 somente alteração de forma. Nos outros 7 pacientes com associação de alterações (2 ou mais) as combinações ocorreram entre anomalias de forma, de posição e estrutura. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os sexos. **Conclusão:** A ocorrência de alterações dentárias na dentadura decídua atingiu mais da metade do grupo de pacientes com fissura pós forame incisivo analisado e a anomalia de estrutura envolvendo opacidade e hipoplasia, isoladas ou associadas, foi a mais prevalente.