

## **Tratamento da recidiva de mordida aberta anterior de maneira simplificada: Relato de Caso**

Neto, J.A.M.<sup>1</sup> ; Sant'Anna G.Q.<sup>1</sup> ; Nogueira, B.P.<sup>1</sup> ; Vallejo, G.E.B.<sup>1</sup> ; Garib, D.G.<sup>1</sup> ; Henriques, J.F.C.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Departamento de Ortodontia, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo.

Comumente o tratamento desta mordida aberta anterior é associado a altas taxas de recidiva geralmente devido ao posicionamento lingual atípico. Portanto, sugestões de tratamentos para o tratamento da recidiva da mordida aberta anterior são de grande valia para a prática ortodôntica. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é apresentar o relato de uma paciente de 16 anos, diagnosticada com uma recidiva da mordida aberta anterior após 3 anos de finalizada a terapia ortodôntica. A paciente foi tratada inicialmente aos 11 anos, quando apresentava a mordida aberta anterior causada por um hábito primário, associado a interposição lingual. O tratamento ortodôntico nesta época foi baseado na utilização de elásticos verticais e dobras de extrusão. Ao fim do tratamento, a paciente se apresentava com 13 anos, o trespasso vertical positivo foi alcançado e após encaminhamento para terapia fonoaudiológica a paciente foi liberada. Entretanto, aos 16 anos, a paciente retornou para o controle, apresentando a reabertura da mordida claramente causada pelo posicionamento lingual atípico que perdurou durante os três anos de acompanhamento. Além disso, associado a má oclusão, a paciente também apresentava uma severa reabsorção das raízes dos incisivos superiores. Portanto, o tratamento da recidiva foi o mais simplificado possível, pela realização de uma mecânica 6x2, com a colagem somente de canino-a-canino superior e inferior, utilização de fio de aço 0.018" como primeiro fio, e elásticos verticais. A recidiva foi tratada de maneira eficiente, e o trespasso vertical positivo foi obtido em 8 meses, afetando minimamente as raízes. O aparelho foi removido e o acompanhamento com a fonoaudióloga foi realizado até o correto posicionamento lingual. Pode-se concluir que o um tratamento simplificado 6x2 com auxílio de elásticos verticais é eficiente para a correção da recidiva da mordida aberta anterior mantendo a integridade das raízes dos incisivos superiores.

Categoria: CASO CLÍNICO