

Avaliação Imaginológica de um achado incidental em mandíbula

Sanches, R.M.¹; Cardoso, R. L. F. N.; Moura, L. L.; Yaedu, R. Y. F.; Rubira-Bullen, I. R. F.; Rubira, C. M. F.¹,

¹ Departamento de Cirurgia, Estomatologia, Patologia e Radiologia, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo.

Paciente do sexo feminino, 53 anos de idade, procurou a Faculdade de Odontologia de Bauru para avaliação de lesões em boca. Na anamnese a paciente associou as lesões ao uso da prótese dentária e durante o exame físico foram observadas lesões exofíticas de superfície lisa e coloração eritematosa em região de palato. Ao se avaliar a radiografia panorâmica que o paciente realiza ao adentrar no serviço, supreendentemente observou-se uma discreta área radiolúcida, bem circunscrita, arredondada, sobreposta a imagem da raiz do dente 43. Foi solicitada uma tomografia computadorizada de feixe cônicoo e notou-se na face lingual do dente 43 uma área bem delimitada, predominantemente hipodensa com pontos hiperdensos, medindo aproximadamente 0,8 cm. O teste de vitalidade pulpar do dente 33 foi positivo e a hipótese diagnóstica levantada foi de que se tratava de algum tumor odontogênico. Foi feita uma biopsia excisional e o após exame anatomo-patológico o diagnóstico final foi de fibroma ossificante. Além disso as lesões associadas a prótese foram diagnosticadas como hiperplasias fibrosa inflamatória e removidas cirurgicamente. O fibroma ossificante é considerado um tumor odontogênico mesenquimal benigno, que tem predileção por mulheres na quarta década de vida, geralmente assintomático e se desenvolve comumente na região posterior de mandíbula. A lesão pode evoluir tomando proporções extensas e ocasionando assimetria facial, reabsorção óssea, deslocamento de estruturas adjacentes e, em casos mais incomuns causar dor. Realizar o diagnóstico ainda no início da lesão poupa o paciente de desconfortos e grandes prejuízos funcionais e estéticos após a remoção da lesão. Desse modo, conclui-se que é de extrema importância a avaliação criteriosa de todo e qualquer exame realizado pelo paciente, possibilitando a identificação precoce de alterações da normalidade e viabilizando tratamentos imediatos e menos invasivos.

Categoría: CASO CLÍNICO