

## **Técnica do clareamento dentário interno imediato após tratamento endodôntico em dente com histórico de trauma**

Paula Assunção Novais<sup>1</sup>, Rivaldo Rittle Dionisio Viana<sup>1</sup>, Ana Carla Pasquini Abu-Yaghi Nogueira<sup>2</sup> (0009-0007-6194-2340), Flaviana Bombarda de Andrade<sup>1</sup> (0000-0002-1238-2160), Lidiane de Castro Pinto<sup>2</sup> (0000-0001-9764-0327)

<sup>1</sup> Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, Bauru, São Paulo, Brasil

<sup>2</sup> Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo, Bauru, São Paulo, Brasil

Dentes desvitalizados podem apresentar alteração da sua cor por diversos motivos, sendo o clareamento dentário interno um procedimento estético simples, conservador e eficaz na reparação da alteração cromática. Paciente do sexo masculino, 16 anos, matriculado no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-USP), comunicou descontentamento com mudança de cor no incisivo lateral esquerdo (22) tratado endodonticamente e com histórico de trauma. Ao exame radiográfico, foi constatado corte inadequado da obturação resultando no seu escurecimento. Após avaliação, optou-se pela realização do clareamento dentário interno imediato: registro da coloração, isolamento absoluto, cirurgia de acesso, corte de 1 mm do material obturador na região cervical, confecção do tampão cervical com cimento de ionômero de vidro (CIV), aplicação de ácido fosfórico 37% por 30 segundos, inserção do peróxido de hidrogênio a 35% na câmara pulpar e na face vestibular do dente por 45 minutos, seguido de lavagem abundante com água e selamento temporário com coltosol e CIV. Após 1 mês, paciente retornou ao setor de Endodontia para avaliação do clareamento interno, tendo sido considerado satisfatório e não necessitando de uma nova sessão. Paciente foi encaminhado para o setor da Dentística para restauração definitiva do elemento dentário. O escurecimento dentário, principalmente quando em dentes anteriores, gera desconforto e insegurança ao indivíduo, sendo o clareamento dentário interno uma técnica segura, com baixo custo e altamente eficaz, que deve, portanto, ser a primeira opção de escolha para devolução da estética dentária. A técnica do clareamento dentário interno imediato restaurou a estética dentária do indivíduo recuperando sua autoestima.