

## 64 EXTRAÇÕES ATÍPICAS NO TRATAMENTO ORTODÔNTICO COMO BENEFÍCIO PARA O PACIENTE

---

TEIXEIRA KF<sup>1</sup>, Antonio MF<sup>1</sup>, Sartori IC<sup>2</sup>, Homem AH<sup>2</sup>, Oliveira TM<sup>3</sup>, Valarelli FP<sup>1</sup>

**OBJETIVO:** O presente trabalho tem por objetivo mostrar um caso clínico de uma paciente Classe II bilateral com apinhamento severo no arco superior e biprotrusão. **RELATO**

**CLÍNICO/EXPERIÊNCIA:** Foi optado pelo tratamento com quatro extrações, sendo um dente em cada quadrante. A escolha dos dentes a serem extraídos fugiu do convencional e, ao invés de eleger os quatro pré-molares, foi decidido extrair os dentes que apresentavam destruição cariosa ou prognóstico duvidoso. Portanto, extraiu-se 14, 45, 26 e 36, ou seja, pré-molares do lado direito e primeiros molares do lado esquerdo. Foi iniciada a retração inicial dos dentes anteriores, alinhamento e nivelamento, fechamento dos espaços com elástico corrente de molar a molar e uso de elástico de Classe II para correção da discrepância anteroposterior. Ao final do tratamento a paciente apresentou uma oclusão satisfatória, sem alterações significantes no perfil, sem desvio da linha média mesmo sendo extraídos dentes de diferentes tamanhos entre os lados. A estabilidade pôde ser comprovada através do acompanhamento feito após um ano de término do tratamento. **CONCLUSÃO:** Ao optar por extrações em um tratamento ortodôntico é muito importante avaliar se há algum dente já diagnosticado inviável de mantê-lo em oclusão. No trabalho presente o paciente foi muito beneficiado ao decidir extrair os dentes com lesão cariosa extensa.