

NP: 1220361

NS 0851423

NP: 1220361 (20.9.93)

### TORCICOLO PAROXÍSTICO BENIGNO DA INFÂNCIA

Casella, EB — Casella LB — Correa, F

Os autores estudaram 2 casos com idade de início dentro dos 2 primeiros meses de vida, sendo 1 do sexo masculino e 1 do sexo feminino, com acompanhamento ambulatorial de cerca de 6 meses.

Ambos os pacientes apresentavam períodos de retração paroxística de pescoço, acompanhada de curvatura lateral do tronco e às vezes com extensão de um dos membros inferiores. Estes sinais ocorriam em média a cada 15 dias, geralmente permanecendo por 4-8 hs. e concomitantemente havia a presença de vômitos. No intervalo das "crises", não havia qualquer sintomatologia e o exame neurológico apresentava-se totalmente normal.

Foram realizados tomografia computadorizada de crânio, eletroencefalograma e provas para pesquisa de refluxo gastro-esofágico, que foram normais.

Os autores discutem a benignidade desta patologia, que evolui de modo satisfatório, abordando ainda as possibilidades fisiopatológicas relatadas.

In: Congresso Paulista de Neurologia e Psiquiatria Infantil, 1 - São Paulo, 1993

P.22

AC