

Status Profissional: (X) Graduação () Pós-graduação () Profissional

Adenoma pleomórfico recidivado em palato mole

Marques, N.G.O¹; Freitas-Filho, S.J.¹; Garcia, N.G.²; Oliveira, D.T.¹

¹ Departamento de Cirurgia, Estomatologia, Patologia e Radiologia – Faculdade de Odontologia de Bauru – USP

² Centro Universitário de Lavras – Unilavras - MG

O adenoma pleomórfico consiste na neoplasia benigna mais comum de glândula salivar, afetando, principalmente, a região do palato quando envolve glândulas salivares menores. Embora seja um tumor de bom prognóstico, a transformação maligna do adenoma pleomórfico recidivado ocorre em aproximadamente 6,2% dos pacientes. Paciente do sexo feminino com 63 anos de idade procurou o cirurgião-dentista devido a lesão recorrente de aspecto nodular, séssil, assintomática, na região do palato mole, recoberta por mucosa com coloração normal e com área central ulcerada, medindo 2,5cm de diâmetro. A cirurgia de uma lesão no mesmo local com diagnóstico de adenoma pleomórfico havia sido realizada há 6 anos. O diagnóstico clínico foi de recidiva de adenoma pleomórfico. Foi realizada uma biópsia incisional, sendo a amostra enviada para análise histopatológica. Os cortes microscópicos revelaram células epiteliais e mioepiteliais dispostas em cordões e formando estruturas ductiformes contendo material mucóide no lúmen, de permeio a um estroma densamente hialinizado em algumas regiões. Também foi notado algumas áreas tumorais circundadas por tecido conjuntivo denso compatível com cápsula fibrosa. Ainda foi observada área ulcerada recoberta por pseudomembrana serofibrinosa e PMNs e mucosa bucal constituída por epitélio estratificado pavimentoso paraqueratinizado e hiperplásico. Não houve sinais de malignidade nos espécimes examinados. O diagnóstico final estabelecido foi de adenoma pleomórfico. A paciente foi submetida à cirurgia e o acompanhamento de um ano não mostrou sinais de recidiva. Este relato de caso clínico destaca que mesmo sendo um tumor benigno de bom prognóstico, as recidivas do adenoma pleomórfico podem ocorrer alguns anos após o tratamento com risco de transformação maligna para o carcinoma ex-adenoma pleomórfico e portanto, estes pacientes devem ser acompanhados com atenção.