

CAMBIOS COGNITIVOS EN PACIENTES CON TRASTORNO LIMITE DE LA PERSONALIDAD EN EL SEGUIMIENTO DE PSICOTERAPIA PSICOANALITICA - Antúnez AEA, Diaz L, Botelho N, Yazigi L

Antúnez Andrés [antunezaea@uol.com.br]

Objetivo: Evaluar cambios cognitivos decurrentes de psicoterapia psicoanalítica en siete adultos con diagnóstico de trastorno límite de la personalidad con comorbidades psiquiátricas. **Método:** Estudio prospectivo de caso clínico en que el sujeto es control de si mismo. **Instrumentos:** Método de Rorschach Sistema Comprehensivo, más específicamente la tríada cognitiva, y Escala Wechsler de Inteligencia-WAIS-III. **Procedimientos:** Los pacientes fueron evaluados antes del inicio de la psicoterapia y a cada año en el seguimiento de cuatro años. **Resultados:** (1) Rorschach: (a) Procesamiento de la información: Lambda sufre muchas alteraciones en el decorrer de los años, ora los pacientes se dejan invadir por las emociones, ora están más defendidos; la aprehensión de informaciones no es precisa sufriendo también oscilaciones (Zd); los procesos de análisis y síntesis (DQ+) mejoran en cuatro pacientes y en tres sufren altos y bajos. (b) Mediación Cognitiva: Las distorsiones perceptivas (X-%) desaparecen en tres pacientes. (c) Ideación: El tipo de vivencial (EB) se define de ambigüal para extratensivo en dos pacientes, en dos oscilan entre introversivo y ambigüal y uno permanece introversivo. En las ultimas evaluaciones cinco pacientes adoptan una actitud pasiva en sus relaciones interpersonales; cuanto a las alteraciones de pensamiento (WSumó) en tres continúan elevadas, en dos desaparecen y en dos ora presentan ora no las presentan. (2) WAIS-III: hay una mejora global en la clasificación de los siete pacientes, sobretudo en el rendimiento ejecutivo. Quanto al desempeño total (QIT), de los cinco pacientes que inicialmente puntuaron QIT Medio, uno lo mantuvo y tres lo elevan para Medio Superior y uno para Superior. Un paciente con QIT Medio Inferior alcanzó resultado Medio, y otro paciente de QIT Superior paso para Muy Superior. **Conclusión:** Los pacientes muestran beneficios en la psicoterapia, con mejora en el rendimiento cognitivo sin embargo persisten algunas dificultades emocionales decurrentes del cuadro clínico psiquiátrico y presentes en el Rorschach. Tales dificultades interfieren en el uso más adecuado de los recursos intelectuales. Así, el proceso psicoterapéutico en pacientes borderlines debe ser más prolongado visando la estabilidad de los procesos afectivo-emocionales.