

Reabilitação oral com overdenture em paciente com fissura labiopalatina

Santos, T.H.¹; Bueno, P.M¹; Dias-Brosco, R.P.²

¹Laboratório de Fisiologia do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo

²Departamento de Implantodontia do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo

A anomalia craniofacial congênita de maior prevalência na espécie humana é a fissura labiopalatina, caracterizada pela descontinuidade anatômica do lábio superior, processo alveolar maxilar e palato. A reabilitação de pessoas com fissuras requer um protocolo terapêutico multiprofissional que se inicia nos primeiros dias de vida e se estende até a fase adulta. Para restaurar a estética e função, geralmente, a etapa final do tratamento é a reabilitação oral, em muitos casos com próteses sobre implantes dentários. O termo overdenture foi proposto para denominar próteses removíveis suportadas por implantes e tecidos moles, uma modalidade de tratamento reabilitador que potencializa a retenção protética quando comparada com próteses totais tradicionais. Em indivíduos com edentulismo associado a fissuras/fístulas buconasais, a prótese overdenture é uma alternativa à prótese total. Um paciente do sexo masculino, leucoderma, de 32 anos, com fissura labiopalatina e histórico de queiloplastia realizada tardiamente na vida adulta chegou ao HRAC/USP para consulta de caso novo com queixas odontológicas e de refluxo alimentar devido a permanência da fissura de palato. Com histórico de vários focos de infecção odontogênicos, foi realizada a adequação do meio bucal, incluindo a extração dos dentes superiores. Optou-se em manter a ampla fissura palatina que não foi corrigida cirurgicamente, pois o paciente teria que passar por diversas palatoplastias secundárias e, devido à escassez tecidual e à cardiopatia crônica do indivíduo, o planejamento cirúrgico foi suspenso. O edentulismo é um fator agravante em indivíduos com fissuras e comunicação buconasal persistente, já que traz dificuldades de retenção da prótese no processo de reabilitação. O tratamento consistiu na instalação de 4 implantes na maxila e confecção de prótese overdenture com obturador. Após a reabilitação oral, o paciente relatou melhora na mastigação, fonação e qualidade de vida com maior integração à vida social.

Fomento: Não se aplica

Categoria: CASO CLÍNICO