

Avaliação da qualidade de vida de protocolos de higienização de próteses totais em pacientes recém reabilitados

Isabella Ribeiro Da Silva Oliveira¹ (0009-0003-9781-4560), Anna Clara Gurgel Gomes¹ (0000-0002-9990-3589), João Pedro Diacis¹ (0009-0000-5922-8112), Amanda Aparecida Maia Neves Garcia¹ (0000-0002-9774-1010), Carolina Yoshi Campos Sugio¹ (0000-0001-8934-4472), Karin Hermana Neppelenbroek¹ (0000-0001-7086-2667)

¹ Departamento de Prótese e Periodontia, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, Bauru, São Paulo, Brasil.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define qualidade de vida como a percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Nesse contexto, os usuários de próteses totais (PT) merecem atenção especial, uma vez que tal reabilitação é responsável por restabelecer as funções estéticas, fonéticas e mastigatórias dos indivíduos totalmente edêntulos. Assim, o presente estudo avaliou como a higienização das PT influenciam na qualidade de vida desses indivíduos. Para isso, as PT superiores (PTS) de 20 pacientes reabilitados nas clínicas de Prótese da Faculdade de Odontologia de Bauru foram aleatoriamente submetidas a um dos seguintes protocolos de higienização (n=5) por 10 dias: CD (controle 1) - escovação da PTS com creme dental por 2 min; SAB (controle 2) - escovação da PTS com sabonete líquido por 2 min; CD+HIP- escovação da PTS com creme dental por 2 min seguida da imersão da PTS em 150 mL de hipoclorito de sódio a 1% por 10 min; SAB+HIP - escovação da PTS com sabonete líquido por 2 min, seguida da imersão em 150 mL de hipoclorito de sódio a 1% por 10 min. Após 10 dias, esses pacientes foram submetidos ao questionário de qualidade vida OHIP-EDENT. Os dados foram submetidos aos testes de Wilcoxon e Kruskal-Wallis ($\alpha=0,05$). Houve redução significativa dos valores de QVRSO relacionados ao OHIP-EDENT após a aplicação dos protocolos de higienização ($p<0,05$), entretanto, não foram observadas diferenças entre a grupos de estudos testados independente do domínio avaliado ($p>0,05$). Os protocolos de higienização das próteses totais impactaram de forma positiva na qualidade de vida dos pacientes.

Fomento: PUB-USP (Projeto nº: 2022-1311); FAPESP (2021/14444-4)