

Achado incidental de cisto ósseo simples em exames radiográficos

Guerra, D.A.¹; Passaretti, B.E.¹; Abellaneda, L.M.¹; Viola, V.P. 1, ²; Oliveira, D.T.¹; Santos, P.S.S.¹

¹ Departamento de Cirurgia, Estomatologia, Patologia e Radiologia, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo.

² Hospital de Amor de Barretos, Departamento de Odontologia.

Cisto ósseo simples é uma cavidade benigna, vazia ou com conteúdo fluido, que se apresenta em osso que não possui revestimento epitelial. Lesão comum em ossos gnáticos. A origem e a patogênese são desconhecidas e controversas, com teorias que não explicam plenamente todas as características clínicas e patológicas desta doença. Paciente do sexo feminino, 11 anos, encaminhada pela sua ortodontista após identificação de uma área radiolúcida, com aproximadamente 3 cm, em região de corpo de mandíbula, próxima a área dos pré-molares, na radiografia panorâmica realizada durante planejamento de tratamento ortodôntico. Durante o exame físico, realizado FOB, notou-se abaulamento discreto em rebordo inferior na região da lesão, com ausência de sintomatologia associada. As hipóteses diagnósticas eram de cisto ósseo simples, tumor odontogênico, ameloblastoma ou sarcoma. Foi então realizado punção aspirativa, apresentando líquido de coloração citrino avermelhado, e curetagem do tecido aderido à parede da lesão, revelando fragmentos de tecido conjuntivo com presença de capilares sanguíneos e trabéculas ósseas irregulares acompanhados de extensas áreas hemorrágicas, confirmando o diagnóstico de cisto ósseo simples. Na avaliação pós-operatória, observou-se que a área incisionada estava eritematosa e edemaciada, com presença de infecção e deiscência. Foi realizada a remoção das suturas e irrigação com clorexidina e reforçadas as instruções de higiene. Após 7 dias, a paciente retornou para nova avaliação e já apresentava bons aspectos de reparação. Atualmente, a paciente se encontra em bom estado geral de saúde e a área da cirurgia está com bom aspecto de regeneração. A paciente foi encaminhada para tratamento endodôntico dos dentes afetados e continua em acompanhamento com a área de estomatologia.

Fomento: JUNO/PUB

CASO CLÍNICO