

Cirurgia Ortognática com avanço de maxila em paciente com fissura labiopalatina: relato de caso

Gomes J.P.F.¹

¹ Setor de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, Universidade de São Paulo.

² Departamento de Cirurgia, Estomatologia, Patologia e Radiologia, Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo.

As Fissuras labiopalatinas estão entre as malformações mais comuns que afetam a face do ser humano. A reabilitação dos pacientes será em várias etapas de sua vida, e com acompanhamento multidisciplinar e integrado em todas as fases do seu crescimento. Por consequência das cirurgias primárias, há uma fibrose tecidual, que afeta diretamente o crescimento das bases ósseas do complexo maxilo-mandibular. A cirurgia ortognática corrige estético-funcionalmente essas discrepâncias ósseas. Dessa forma, o objetivo principal desse caso é relatar o tratamento com cirurgia ortognática do paciente Darlysson Santos Silva, paciente masculino, com má oclusão Classe III, não sindrômico, com fissura labiopalatina, realizada no HRAC. Na análise facial paciente apresentava Overjet de -6mm, sem presença de cant, e sem desvio de linha média. O planejamento cirúrgico foi avanço de 5mm com impacção de 2mm na maxila. Paciente encontra-se em controle pós-operatório, com oclusão estável e em finalização ortodôntica. A cirurgia ortognática possibilita a correção de discrepâncias ósseas, podendo assim proporcionar ao paciente uma melhora tanto estética quanto funcional, otimizando sua qualidade de vida.